

HorseMax-blandinger

HorseMax 60: uden kløver

HorseMax 61: med kløver

HorseMax 60S: struktur – uden kløver

HorseMax 258 SOLFAXI: struktur – med urter

HorseMax 62: struktur – specielt egnet til wrap

HorseMax 60 - er uden kløver, og indeholder en stor andel almindelig rajgræs. Blandingen er meget produktiv, hvis den får gødning og den vælges, hvor der er "fri" adgang til kvælstof, og hvor der ønskes et stort slæt og senere afgræsning. Bør sås forår eller august indtil første halvdel af september.

HorseMax 61 - indeholder hvidkløver og en stor andel almindelig rajgræs. Blandingen vælges når kvælstof skal købes dyrt og er overvejende til afgræsning - men kan også bruges, hvor der tages slæt forud for afgræsning. Bør ikke anvendes til ponyer og islændere på grund af kløverindholdet. Bør sås forår eller først i august.

HorseMax 60S - er med nedsat sukkerindhold, og indeholder samtidig græsser med god struktur. Blandingen anbefales til kombineret anvendelse som hø, wrap og afgræsning. Især velegnet til ponyer og islandske heste, samt hvor man i øvrigt ønsker foder med høj struktur og lavt sukkerindhold til f.eks heste med tendens til overvægt. Bør sås om foråret eller først i august.

HorseMax 258 SOLFAXI - blandingen indeholder en række græsser med nedsat sukkerindhold og høj strukturværdi. Derudover er der 8 forskellige arter af urter, bælgeplanter og græsser, så blandingen kan give et meget alsidigt foder. Blandingen kan anvendes til afgræsning af alle typer heste. Bør sås forår eller først i august.



Horsemax 62 - 50% af blandingen består af græsser med meget struktur, hvilket giver: relativt lav fordøjelighed, lavt indhold af sukker, og højt udbytte. Anbefales til produktion af wrap. Kan afgræsses hen over sommeren, og er specielt egnet til ponyer og islandske heste. Bør sås forår eller først i august.

Hø/wrap: Alle ovennævnte blandinger kan bruges, men også blanding af lucerne og timoté kan anbefales.

Læs mere på

www.dlf.dk under Produkter/Græs til heste

HorseMax

HorseMax er navnet på frøblandinger til hestefolde fra DLF-TRIFOLIUM. Vi har mange års erfaring med frø til græsmarker og sammensætningen af græsfroblandinger. I denne lille folder finder du blandinger, der opfylder hestenes behov for foder og motionsareal.

God etablering og vedligeholdelse af græsmarker er vigtigt for at opnå det bedste resultat. I folderen finder du hjælp til at finde den rette frøblanding, og vi giver dig nogle grundlæggende tips til, hvordan du bedst muligt sår og vedligeholder en græsmark med en HorseMax-blanding.

Forhandler:

 **DLF**
TRIFOLIUM
SEEDS & SCIENCE

DLF-TRIFOLIUM • Ny Østergade 9 • 4000 Roskilde
Tlf. 70 12 16 00 • Fax 70 12 16 01 • www.dlf.dk • dlf@dlf.dk

HorseMax
Etablering og eftersåning
af græs til hestefold

 **DLF**
TRIFOLIUM
SEEDS & SCIENCE

Alle fotos i denne brochure er med copyright* af DLF-TRIFOLIUM A/S. For brug af fotos bedes du kontakte DLF-TRIFOLIUM A/S.




HORSEMAX
by DLF-TRIFOLIUM



Forberedelse

Arealet gøres klar med en grundig bearbejdning af jorden ved pløjning og jordpakning, eventuelt fræsning. En gammel græsmark bør fræses før pløjning. Måske skal den eksisterende mark allerførst behandles med et ukrudtsmiddel (f.eks. Roundup), der fjerner alle planter, hvis der er meget rod ukrudt (kvik, tidsler, skræpper mv.) på arealet.



Harvning

Lige før såning harves jorden 1-2 gange i 6-8 cm dybde, så jorden er løs og jævn. Der skal ikke harves mere end netop nødvendigt for at lave et jævnt såbed. Undgå så vidt muligt at udtørre jorden – fugtigheden bør bevares så højt oppe i jorden som muligt.



Tromling

På sandjord tromles umiddelbart efter med cement-tromle. På lerjord tromles evt. med ring- eller knast-tromle. Formålet er at pakke det øverste jordlag, så frøet ikke kommer for langt i jorden, og der kan sikres god kontakt mellem frø og den fugtige jord.



Gødning

Før såning bør jorden grundgødskes, så de nye græsplanter er sikret næring i den første tid. Det er vigtigt, at gødningen fordeles helt jævnt over arealet. Det anbefales at anvende NPK-gødning. Følg altid emballagens anvisninger, når du doserer gødning.



Såning

I etableringsfasen er græsplanterne meget følsomme over for udtørring. Til såning er det derfor en fordel at vælge en periode, hvor jorden indeholder nogen fugtighed. Samtidig er det en fordel, at jorden er lun, mindst 10 grader, for det fremmer både spiring og rodvækst. Den bedste såtid er om foråret (marts-april) eller i sensommeren (august). Såning skal ske straks efter jordbehandlingen.

Ved såning om foråret vælger mange at så græsfrø med vårbyg eller havre som dæksæd. Kornet sås først. Brug 80-100 kg pr. ha, efterfulgt af tromling. Dernæst sås frøblandingen. Dæksæden kan høstes som grønkorn eller helsæd til wrap/ensilage eller som modent korn.

Græsfrøene i sækken har forskellig størrelse, så for at få en jævn fordeling af store og små frø skal frøene blandes grundigt, før de sås. Rækkeafstanden skal være lille, så frøet fordeles så godt som muligt over hele arealet. Såning må ikke ske dybere end ca. 1 cm. Såning i dæksæd forår: 22-26 kg. Såning i renbestand forår/sensommer: 28-32 kg.



Første benyttelse

Når græsset er vokset godt til og er blevet 10-15 cm højt, er det klart til benyttelse. Da græsplanterne ikke har et stærkt rodnet, er det vigtigt at undgå for stor belastning af arealet – især i perioder med fugtigt vejr.



Første gang er det derfor en god idé at anvende marken til slæt (wrap* eller hø), da de unge planter ikke tåler færdsel fra dyr, der græsser. Evt. afgræsning skal ske med forsigtighed på den nye græsmark, så dyrene ikke ødelægger planterne. Efter første anvendelse gødes marken igen, og når græsset er vokset til 8-12 cm, er marken klar til normal afgræsning.

Du kan finde vejledning om etablering og vedligeholdelse af hestefolde på www.dlf.dk under Produkter/Græs til heste.

*Vi anbefaler at wrap først benyttes ca. 5 uger efter wrapping.



Eftersåning

Udbytte og kvalitet falder i græsmarker med tiden, så det er en god idé at vedligeholde og holde liv i marken med eftersåning. Det bør ske f.eks. hvert 2. år - tidligt forår eller i august og med den samme blanding, som marken er tilsået med. Udsædsmængde 15-20 kg pr. ha.



Strigling

I forbindelse med eftersåningen skal der ske en kraftig strigling af overfladen lige før eller samtidig med såningen. Striglingen fjerner eventuelle døde blade og andre plantedele, og skaber et tyndt lag af løs jord, som kan danne såbed for de nye frø.



Tromling

Eftersåningen afsluttes med tromling. Herved trykkes frøene fast mod jorden og vil spire lettere, fordi de er kommet i kontakt med den fugtige jord. Samtidig trykkes eventuelle sten tilbage i jorden.



Vanding

Det er en god idé at foretage eftersåningen i en fugtig periode eller forud for regnvejr. Hvis det er muligt, kan marken naturligvis også vandes efter såningen, men det bedste resultat opnås normalt med rigtigt regnvejr.



Gødning

Marken gødes, når det nye frø er spiret frem. Her anvendes samme NPK-gødning som ved anlæg af ny græsmark. Følg anbefalingerne på emballagen ved dosering af gødning.



Første benyttelse

Efter 4-6 uger er marken igen klar til brug. Start med forsigtig afgræsning, så dyrene ikke træder de spæde nye planter itu, eller græsser dem så tæt ned, at planterne dør. Vær klar til at flytte dyrene efter nogle dages let afgræsning.

