

Oversåning i græsmarker



Vedligehold af græsmarker uden omlægning

Oversåning – hvorfor ?

Græsplanter yder det højeste udbytte i 1. brugsår. Med markens alder stiger også risikoen for huller i grønsværen og dermed for invasion af ukrudt.

Hvornår ?

Oversåning som en rutinemæssig del af græsmarksplejen sker bedst i juli-august måned efter slæt eller afgræsning. Reparationer efter vinterskader skal ske tidligt forår.

Hvordan ?

- Fjern al overskydende græs ved slæt eller tæt afgræsning
- Så 20-25 kg frø pr. ha med en velegnet frøblanding. Brug f.eks. såmaskine med skiveskær eller græsmarksstrigle med påmonteret såkasse
- Troml arealet med betontromle umiddelbart efter såning
- Vent 10-15 dage med evt. kvælstoftildeling
- Slætmarker kan udnyttes, når genvæksten er klar til det.
- Afgræsningsmarker kan benyttes 10-15 dage umiddelbart efter oversåning – derefter skal de unge planter have tid til at vokse til

Valg af blanding

Græs til oversåning skal være hurtigt voksende. Derfor bør hybridrajgræs, rajsvingel og/eller almindelig rajgræs indgå – enten i renbestand eller i blanding.