

Galmyg og svampe i engrapgræs

- **Karate 2,5 WG er off-label godkendt til bekæmpelse af skadedyr i markfrø**
- **Galmyggene kan fanges i fangbakker, - brug dem!**
- **Engrapgræsgalmyg forventes først at gå på vingerne i starten af maj**

Engrapgræsgalmyggens flyvning begynder når der har været en vis sum dage med over 5 grader C i foråret. Engrapgræsgalmyggen ligger stadig godt beskyttet i sit puparium, som det ser ud lige nu, forventes flyvningen at starte omkring 2. maj. De faktiske temperaturer for resten af april kan dog ændre en smule på dette. For Stevns vedkommende vil flyvningen sandsynligvis ske omkring 1 dag senere, mens Lolland ligger ca. 2 dage forud.

Allerede nu kan der fanges galmyg i fangbakkerne. De galmyg, der fanges, ligner den rigtige engrapgræsgalmyg, men denne "Gale Myg" er en smule mindre, en lille forskel i vingervation og mangler behåring på vingerne. Vi anbefaler en sprøjtning af engrapgræsmarker når man i sin fangbakke fanger over 50 galmyg på en dag eller over 100 galmyg på en uge. På Stevns har man observeret op til 40-60 galmyg pr. uge, men dette antal forventes at stige.

Engrapgræsgalmyggen (*Mayetiola schoberi*) er endnu ikke registreret. Den forventes i første halvdel af maj som nævnt ovenfor, så det kan derfor være nødvendigt at gentage sprøjtningen her, hvis stor flyvning af den registreres på det tidspunkt.

Ved at anvende 0,2 kg Karate 2,5 WG forventes effekt på galmyg samt en repellerende (afskrækkende) effekt i ca. 10 dage.

Er det mere end 14 dage siden der sidst er sprøjtet og er der igen mange galmyg i fangbakken, bør sprøjtningen gentages.

Flyvninger af galmyg i slutningen af maj forventes ikke at kunne skade dette års høst af engrapgræs.

Svampebekæmpelse i engrapgræs

Med lunere vækstforhold kan vi forvente angreb af svampe i den kommende tid.

Svampebekæmpelse foretages ved begyndende angreb af meldug og rust specielt i plænetyper som Miracle, Broadway og Conni, som er de mest udsatte sorter. Også sorter som Panduro, Evora og Lato kan angribes, mens en sort som Compact er mindre modtagelig. Særlig gunstigt svampevejr kan også udløse tidlige meldug og rustangreb i sorter som f.eks. Balin.

Meldugangreb kan udvikle sig stærkt, så kig efter symptomer, hvor der er læ, og hvor plantebestanden er kraftig, da angrebene ofte begynder her.

Den største skade af svampeangreb er set, hvor afgrøden samtidig med kraftige svampeangreb udsættes for tørke. Ligeledes ser det ud til at Hussar behandlinger kan øge planternes modtagelighed for svampeangreb. Der kan anvendes 0,1 l/ha Amistar + 0,1 l/ha Zenit 575 EC ved begyndende angreb. Er der et større angreb i gang skal doseringen hæves. Også Zenit og Bell og Orius er godkendt til engrapgræs. Skal frøgræshalmen opfodres må kun Amistar anvendes.

Sprøjtning mod skadedyr og svampe kan kombineres med MCPA mod tidsler.

Billedgalleri



Plastbakke med vand + en dråbe sulfo udsat i engrapgræsmark. Eneste måde hvorpå man kan få et godt indtryk af om der er behov for en bekæmpelse af skadedyr i engrapgræs

Masser af små galmyg især "Den gale myg" fra fangbakke i 2. års Conni, april 2009



Den rigtige engrapgræsgalmyg er behåret på vingerne og er lidt større end de "gale" myg

De "gale" myg

Venlig hilsen
DLF-TRIFOLIUM A/S