

Reglone i engrapgræs, hvene, rødsvingel og hundegræs

- **Mildt efterår og Reglone**
- **Frost efter behandling øger effekten**
- **Vær klar til at rykke ud, ofte er der kun få optimale dage at sprøjte i**

Efteråret har vist sig fra den milde side i år, og det har været godt for frømarkerne, som i mange tilfælde fik en lidt "skæv" start efter sommerens høstproblemer. Nu kan vi forvente lidt lavere temperaturer og gradvist vil væksten gå i stå i frøgræsset.

Dermed kan vi gøre klar til Reglone sprøjtning i de marker, der har behov.

Det lune efterår og fugtig jord har givet mulighed for fremspiring og vækst af græsukrudt, så der vil i mange marker være behov for en behandling med Reglone i hele, eller dele af marken. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på alm. rapgræs, hvor Reglone kan have god effekt især i forbindelse med frost.

Reglone er bl.a. godkendt til brug i engrapgræs, hvidkløver og hvene uanset udlægsmetode eller markens alder.

Reglone i engrapgræs og hvene

I engrapgræs og hvene er det vigtigt at vente til december-januar måned, så dagen er kort og væksten er gået i stå.

Plænetyperne er normalt lidt længere om at gå af vækst end fodertyperne.

Bedste tidspunkt for Reglone behandling er fra første halvdel af december til midt i januar. Det er vigtigt at bekæmpe store planter af enårig rapgræs, hvis andre behandlinger i efteråret ikke har været tilstrækkeligt effektive. Desuden er Reglone det mest effektive middel vi har mod alm. rapgræs i engrapgræs.

Effekten overfor hejre kan være meget god, såfremt Reglone behandlingen udføres op til

en frostperiode. I forsøg har vi også set god effekt på væselhale.

I engrapgræs udlagt i vintersæd fås en god effekt på spildplanter af vintersæd.

Risiko for skade i engrapgræs

Hvis engrapgræsudlægget er svagt skal man være varsom med at bruge Reglone. Risiko for skade i engrapgræs er størst i svage 1. års marker med lav udvikling af underjordiske udløbere og i marker som ikke er gået af vækst. Der er en tendens til at korte sorter og sorter med lysegrønne blade (Conni, Miracle) er mest følsomme overfor behandling med Reglone, men er udlægget kraftigt og væksten standset er risikoen for skade på afgrøden mindst.

Er man i tvivl om marken skal sprøjtes bør man altid rådføre sig med sin frøavlskonsulent.

Jo senere der sprøjtes efter midt i januar desto mere påvirket er engrapgræs i marts, hvor væksten skal starte. Sen sprøjtning giver normalt også dårligere ukrudtseffekt.

Ved begrænset forekomst af enårig og alm. rapgræs, kan Reglone behandlingen undlades. Enårig rapgræs kan bekæmpes til foråret med Hussar, og der er mulighed for at weedwipe alm. rapgræs i korte sorter til foråret.

Virkningsbetingelser af Reglone

Den bedste effekt af Reglone opnås ved sprøjtning om formiddagen i klart vejr, gerne efter en frostperiode. Reglone er et kontaktmiddel, så der skal anvendes en relativ stor vandmængde, mindst 250-400 l vand pr. ha, laveste vandmængde hvis der er meget dug. Rim på bladene vil nedsætte effekten. Frost efter behandlingen vil øge effekten på ukrudtet.

De to seneste vintre har vist, at længerevarende snedække umiddelbart efter Reglone behandling forstærkede effekten. Er der derfor udsigt til sne lige efter udsprøjtning reduceres doseringen af Reglone til max 1,5 l/ha.

Husk at tilsætte 0,1 % Lissapol.

Reglone optages hurtigt i bladene og hovedparten af midlet vil være optaget i løbet af 10 minutter efter udsprøjtningen.

Doseringer

Anvend fuld dosis, 1,8-2,0 l/ha, af Reglone overfor tuer af alm. rapgræs, store planter af enårig rapgræs.

Spildkorn af byg kan normalt klares med 0,8-1 l/ha Reglone. Hvedespildkorn kan bekæmpes med 1,5 l/ha Reglone, hvis der efterfølgende kommer frost.

Er engrapgræsset svagt udviklet og derfor mere følsom overfor afsvidning, bør doseringen ikke overstige 1,5 l/ha Reglone.

Mod svækket og småt enårig rapgræs kan doseringen nedsættes til 1,5 l/ha.

Er problemet nyfremspirede planter med et par blade er 1,0-1,2 l/ha nok.

Kvalitetsfradrag for indhold af andre rapgræsser

Indhold af andre rapgræsser i engrapgræs er stærkt kvalitetsforringende. Der er ingen mulighed for at rense sig fra problemet. I værste fald kan frøet ikke certificeres, men også ved lavere indhold, er der kvalitetsfradrag, idet der trækkes 5 % af afregningsprisen ved indhold af andre rapgræsser på 0,1-0,5 % og 10 % ved indhold over 0,5 %.

Reglone i rødsvingel og hundegræs

Reglone kan anvendes mod væselhale og græsukrudt i rødsvingel og hundegræs. Til begge arter er der givet en off-label godkendelse på hhv. på 0,5 l/ha Reglone + spredklæbemiddel i rødsvingel og 1,0 l/ha Reglone i hundegræs. I rødsvingel må Reglone kun anvendes i områder af marken med udbyttereducerende forekomst af væselhale og kun i flerårs marker, dvs. ingen anvendelse i 1. års rødsvingel.

I hundegræs gælder tilsvarende, - kun anvendelse i områder af marken med udbyttereducerende forekomst af græsukrudt eller spildkorn. Find off-label vejledningerne på vores hjemmeside, <http://www.dlf.dk/Avlerservice.aspx>

Der er en række kopiprodukter i markedet til Reglone, 7 i alt, med navne som eksempelvis Agros Diquat, Inter-Diquat, LFS Diquat og Quad-Glob 200SL. Ikke alle disse produkter har anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvene beskrevet på etiketten. Kontroller derfor at etiketteteksten er i overensstemmelse med behovet i din mark.

Venlig hilsen
DLF-TRIFOLIUM A/S