

## Efterårsbehandling af engsvingel

- **Gødskning, tidspunkt og mængder**
- **Efterårsbehandling**
- **Ukrudtsbekæmpelse og enårig rapgræs**

### Behandling af marken forud for 1. høstår

Når dæksæden er høstet og halmen fjernet, er afpudsning af stubben en af de første ting der skal ske. Det er vigtigt at de nye planter busker sig mest muligt, og dette opnås ved at afpudse i en højde på ca. 5 cm. Ved afpudsning reducerer man stubbens skyggevirkning, så der kan komme mest mulig lys ned til de små planter.

Det er naturligvis en fordel, at man sætter så lav stub som muligt med mejetærskeren. Hvis der er sat høj stub, er det naturligvis endnu vigtigere hurtigst muligt at få afpudset. Er der mere materiale end at det kan forsvinde mellem udlægsplanterne, bør dette efter et par dages tørring rives sammen og fjernes.

Der følges op med en eller to afpudsninger senere på efteråret.

### Behandling forud for 2. høstår.

Afbrænding af frøgræshalmen forud for 2. års høst er en god løsning

Hvis halmen derimod er fjernet vil en god løsning være at afpudse i bund (5 cm's dybde), således at gammel stub bliver afhugget. Dette er meget vigtigt, så der bliver lys og plads til de nye skud, som skal udvikle sig til frøstængler i 2011.

Der følges op med en eller to afpudsninger senere på efteråret.

Et alternativ er at gøde marken straks efter høst med 60-70 kg N/ha, og foretage et slæt sidst i september. Efter slættet tilføres 30-40 kg N, således at marken går vinteren i møde, med en ordentlig næringsstofbalance.

Udnyttes marken til efterslæt eller afgræsning er der mulighed for at tilføre kvælstof til dette.

Hvis genvæksten **ikke** er udnyttet, skal der eventuelt foretages en afpudsning sidst i september for at undgå en for kraftig pels inden vinter. Der pudses i en højde af 8-10 cm.

Efter afpudsning tildeles 30-40 kg N/ha.

### Gødskning

Udlægsmarken tilføres 30-40 kg N/ha sidst i september, hvis den er normalt udviklet.

**Gødningsnorm til engsvingel høst 2012:** 100 kg/ha. Mængderne er total efterår + forår. Vedr. gødningsnormer til slæt og afgræsning og regler i øvrigt henvises til Plantedirektoratets vejledning.

### Ukrudtsbekæmpelse (2-kimbladet ukrudt)

DFE er godkendt til brug om efteråret i frøgræs. Efter høst af dæksæden er der ingen gode bekæmpelsesmuligheder mod stort tokimbladet ukrudt om efteråret. Det samme gælder i 2. og 3. års markerne, hvor der også sjældent er et behov.

Anvendelse af Express i engsvingel frarådes.

Efterårsfremspiret ukrudt bekæmpes med 0,2 l/ha Oxitril + 25-50 ml DFF.

Dette giver en bred effekt på de fleste efterårsspirende ukrudtsarter.

Fox kan anvendes med 1-1,5 l/ha fra ukrudtets 2-6 blads stadie. Fox bekæmper storkenæb mm.

### **Enårig rapgræs**

Enårig rapgræs kan være et stort problem i 1. års engsvingel, fordi denne ofte er meget åben i vækst og tolerant overfor andre græsser.

Bekæmpelse foretages ved en split-behandling med Boxer, når det enårige rapgræs er under fremspiring i doseringen 1 l/ha Boxer. Behandlingen kan evt. gentages efter behov efter et par uger. Jordfugtighed ved sprøjtning sikrer den bedste effekt. Stomp kan også anvendes. Både Boxer og Stomp skal anvendes inden græsukrudtet får over et par blade, - ellers er virkningen utilstrækkelig.

<p>Boxer er off-label godkendt til efterårsbrug med op til 2 l/ha. Stomp er off-label godkendt med op til 1,2 l/ha. Off-label godkendelser kan hentes på vores hjemmeside: <a href="http://www.dlf.dk/Avlerservice/Off_label_vejledninger.aspx">http://www.dlf.dk/Avlerservice/Off_label_vejledninger.aspx</a></p>
--

Venlig hilsen  
DLF-TRIFOLIUM A/S