

Er græsmarken i orden ?

- husk forårseftersynet

Så snart temperaturerne begynder at stige om foråret er det tid at give græsmarken et forårseftersyn. Hvis græsmarken er passet godt sidste år er der næppe nogen problemer med overvintringen, men der er generelt to forhold, som skal vurderes og evt. behandles:

Sneskimmel

Forekommer hvis marken er gået til vinter med for lang pels - som regel er der tale om afgræsningsarealer, der ikke blevet afpudset. Områderne med langt græs bør afpudses så snart det er muligt, så græsvæksten kan komme hurtigt i gang.

Hvis der er tale om en hel mark i sædskiftet, som det måske ikke har været muligt at høste i efteråret på grund af megen nedbør, bør marken omlægges helt - produktion og kvalitet vil blive for ringe selv om det er muligt at afpudse marken (ofte vanskeligt, hvis afgrøden er "sunket" helt sammen). Desuden vil kløver meget tit blive for dominerende i sådanne marker.

Udvintring - bare pletter

Hård frost og - ikke mindst - skiftende tø og barfrost kan gøre skade på græsmarkerne i form af døde planter. Risikoen vil være størst i ældre græsmarker (2. eller følgende brugsår); hvor marken har et stort overskud af kvælstof eller hvor sidste slæt har været taget med for kort stub.

Levende græsplanter vil, så snart temperaturen er til det, begynde at vokse. Dette ses først på rødderne, der skal være hvide og desuden skal der også ret hurtigt vise sig grønne skud over jorden.

Der skal være 15-25 levende planter (kløver eller græs) pr. løbende meter sårække i en mark til slæt mens der i afgræsningsmarker bør være 30-40 planter pr. meter. Pletter i marken bør ikke accepteres - hvis der mangler planter, mangler der også produktion.

Der er to muligheder for forbedring af marken - enten total omlægning eller isåning.

Omlægning af græsmarker

Efter vinterskadede marker er den hurtigste måde at skaffe en ny græsmark på at udlægge den i renbestand (uden dæksæd) eller i en afgrøde, der høstes grønt, typisk

grønbyg eller grønært. Til afgræsning kan også havre eller vårbyg anvendes når der sås 30-40 kg dæksæd og 30-35 kg kløvergræsblanding pr. ha.

Isåning i eksisterende græsmarker

Hvis marken skønnes at have et godt potentiale for produktion, men blot mangler planter i større eller mindre pletter, kan isåning være en mulighed. Det skal ske så tidligt som muligt, dog uden at der laves køreskader. Der kan anvendes almindelig såmaskine med stramme såskær eller strigle med påmonteret såkasse og der skal i begge tilfælde tromles efter såningen. Såmaskine med skiveskær kan også anvendes.

Til isåning bør anvendes en blanding med hurtigvoksende arter, f.eks. hybrid- eller almindelig rajgræs. Ved behov også med indhold af kløver.