

## Frøblandinger til får



### Fåreblanding, ELITE-blanding 52

Er sammensat ud fra kravene om bred tilpasning til de fleste jordtyper med god varighed og slidstyrke. Den er tørketolerant og velegnet til afgræsning i 2-3 år.

### ELITE-blanding 21, 22 og 23

Er specielt sammensat med henblik på intensiv benyttelse af afgræsning. De består overvejende af hvidkløver og alm. rajgræs. De benyttes, hvor der ønskes en meget høj produktion på ikke for tør jord. Varigheden er 1-3 år. Især blanding 21 er også velegnet til høslæt.

### ELITE-blanding 24

Varig blanding til normale, ikke for tørre jordbundsforhold. Den består af såvel rajgræs som de mere

varige arter timothe og engsvingel - velegnet til høslæt.

### ELITE-blanding 25

Især egnet til tørre forhold uden vanding. Den består udover rajgræs af de varige arter timothe, engsvingel og rødsvingel. Velegnet til høslæt.

### ELITE-blanding 26

Tilpasset **lave, fugtige arealer**. Indholdet af rajgræs er lavt, idet blandingen domineres af varige arter som timothe, engsvingel og rapgræsser. Velegnet til hø.

### Vinterfold

Her anbefales ELITE-blanding 33, som udlægges i værkorn. Folden bruges i vinterens løb og pløjes igen når det bliver forår. Det skåner de veletablerede folde.

### Høslæt

Hertil kan de fleste af ovennævnte blandinger anvendes, men også en blanding af lucerne og timothe kan anbefales.

Læs om etablering af græsmarker på næste side →

## Oversåning

Udbyttet i græsmarken falder ved brug med 10-25 % pr. år i de første 3-4 brugsår. Hvis omlægning er vanskelig, anbefales det at foretage oversåning hvert 2. år med 10-15 kg pr ha. Hertil benyttes ELITE-blanding 33. Oversåning skal ske om foråret når jorden er fugtig og begynder at tage varme, eller evt. i august. Almindelig såmaskine, såmaskine med skiveskær samt gødnings- eller universal-spreder kan anvendes. Frøet skal i kontakt med jorden før det kan begynde at spire. Det kan skabes ved at foretage let harvning eller tromling efter at frøet er sået.



## Dyrkningsvejledning

### Jordbund

Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste - almindelige - jorder er rajgræsserne de foretrukne, men også timothe, engsvingel og engrapgræs trives her. Under tørre forhold kan suppleres med hundegræs og rødsvingel, medens fugtige forhold især favoriserer timothe, engsvingel og alm. rapgræs.

### Udlægsmetoder

I Danmark er det normalt, at græsmarker etableres som udlæg i korn, ofte vårbyg. Alternativt kan udlæg ske i vintersæd eller i renbestand. Sikrest fremspiring sker i april-maj eller august-september, medens juni og juli ofte er vanskelige etableringsperioder.

### Udlæg i vårsæd

Her skal vælges en stråstiv sort af byg eller havre. Det er vigtigt, at lejesæd undgås - udsædmængden kan med fordel nedsættes til 1/2 - 2/3 af normal, ligesom N-gødkningen skal være moderat. Dæksæden kan høstes som grønkorn, helsæd eller moden. Græsmarken kan også etableres ved udlæg i halvbladløse ærter eller blanding af ærter og byg.

### Udlæg i vintersæd

I vintersæd til modenhed bør kun udlægges sildige, langsomt etablerende græsser, idet tidlige typer vil kunne nå at genere kornet meget og evt. sætte frø før høst af dæksæd. Om foråret kan græsmarken etableres i allerede etableret vintersæd. Dette lykkes normalt bedst på let jord ved meget tidlig såning - helst uden forudgående jordbehandling.

### Udlæg i renbestand

Etablering af græsmarker efter høst af korn kræver for kløverblandinger såning inden midten af august, medens rene rajgræsser kan sås senere - se skema.

	Med dæksæd			Uden dæksæd		
	Vårsæd	Vintersæd		Såning i renbestand		Seneste såtid
		Efterår	Forår <sup>1)</sup>	Forår	Efterår	
Kløvergræs	+	+ <sup>2)</sup>	+	+	+	10/8
Ital.rajgr.	+	-	+	+	+	15/9
Hybridrajgræs	+	-	+	+	+	10/9
Tidl. og mid-deltidl. alm. rajgræs	+	-	+	+	+	1/9
Sildig alm. Rajgræs	+	(+)	+	-	+	20/8
Andre græsser	+	+	+	+	+	20/8

1) På sandjord

2) I vinterrug og -byg til grønkorn. Såtid senest 1. september.

### Såning

Såning af udlæg bør ske for sig, men snarest muligt efter dæksæden. Jorden skal være jævn og fast - evt. tromles mellem såning af dæksæd og udlæg. Udlægget sås med brug af efterharve eller anden dækning. Sådybden må under ingen omstændigheder overskride 1 cm, når der anvendes blandinger med kløver eller andre småfrøede arter. Rajgræsser spirer tilfredsstillende fra 2-3 cm's dybde.

### Udsædsmængde

Mængden af udsået frø skal være så høj, at der opnås en plantebestand på 450-500 pr. m<sup>2</sup> - jævnt fordelt på arealet. Mange forhold omkring såningen - især klima og sådybde - påvirker plantebestanden - derfor anbefales normalt rigelig udsædsmængde, for frøblandingerne 24-28 kg/ha.

ELITE-blandinger fra DLF-TRIFOLIUM forhandles af grovvarerforretninger over hele landet Dyrkningsvejledning for græsmarker kan rekvireres på 46330300 eller ses på [www.dlf.dk](http://www.dlf.dk)

