

**HorseMax 50**, uden kløver

**HorseMax 50S**, struktur – uden kløver

**HorseMax 51**, med kløver

**HorseMax SOLFAXI**, struktur – med urter

## HorseMax 50

Uden hvidkløver. Vælges, hvor der er "fri" adgang til kvælstof, og hvor der ønskes et stort slæt og senere afgræsning.

## HorseMax 51

Med hvidkløver. Vælges, når kvælstof skal købes "dyrt" og er overvejende til afgræsning, men kan også bruges, hvor der tages slæt forud for afgræsning.

## HorseMax 50S

Er med nedsat sukkerindhold, men indeholder græsser, der giver god struktur i foderet. Denne blanding anbefales derfor til ponyer, islandske heste, og hvor der i øvrigt ønskes foder med høj strukturværdi og lavt sukkerindhold.

## HorseMax SOLFAXI

Indeholder en række græsser med nedsat sukkerindhold og høj strukturværdi. Derudover er der 8 forskellige arter af urter, bælgplanter og græsser, så blandingen kan give et meget alsidigt foder. Blandingens kan anvendes til afgræsning af alle typer af heste.

## Vinterfold

Her anbefales ForageMax 33, som udlægges i vårkorn [spørg evt. din forhandler]. Folden bruges i vinterens løb og plojes igen, når det bliver forår. Det skåner de veletablerede folde.

Til hø kan alle ovennævnte blandinger anvendes, men også blanding af lucerne og timote kan anbefales.



Læs mere på

[www.dlf.dk](http://www.dlf.dk) under Produkter/Græs til heste

## HorseMax

HorseMax er navnet på frøblandinger til hestefolde fra DLF-TRIFOLIUM. Vi har mange års erfaring med frø til græsmarker og sammensætningen af græsfrøblandinger. I denne lille folder finder du blandinger, der opfylder hestens behov for foder og motionsareal.

God etablering og vedligeholdelse af græsmarker er vigtigt for at opnå det bedste resultat. I folderen finder du hjælp til at finde den rette frøblanding, og vi giver dig nogle grundlæggende tips til, hvordan du bedst muligt sår og vedligeholder en græsmark med en HorseMax-blanding.

Forhandler:

 **DLF**  
**TRIFOLIUM**  
SEEDS & SCIENCE

DLF-TRIFOLIUM • Ny Østergade 9 • 4000 Roskilde  
Tlf. 46 33 03 00 • Fax 46 32 08 30 • [www.dlf.dk](http://www.dlf.dk) • [dlf@dlf.dk](mailto:dlf@dlf.dk)

**HorseMax**  
Græs til hestefolden

 **DLF**  
**TRIFOLIUM**  
SEEDS & SCIENCE

**Etablering  
og  
eftersåning**

All photos in this brochure are with copyright © of DLF-TRIFOLIUM A/S. For use of photos please contact DLF-TRIFOLIUM A/S.

[www.smpaticodk](http://www.smpaticodk)



## Forberedelse

Arealet gøres klar med en grundig bearbejdning af jorden ved pløjning og jordpakning, eventuelt fræsning. En gammel græsmark bør før pløjning ødelægges med fræser. Måske skal den eksisterende mark allerførst behandles med et ukrudtsmiddel (f.eks. Roundup), der fjerner alle planter, hvis der er meget rodukudt (kvik, tidsler, skræpper mv.) på arealet.



## Harvning

Lige før såning harves jorden 1-2 gange i 6-8 cm dybde, så jorden er løs og jævn. Der skal ikke harves mere end netop nødvendigt for at lave et jævnt såbed. Undgå så vidt muligt at udtørre jorden – fugtigheden bør bevares så højt op i jorden som muligt.



## Tromling

På sandjord tromles umiddelbart efter med cementtromle. På lerjord tromles evt. med ring- eller knastromle. Formålet er at pakke det øverste jordlag, så frøet ikke kommer for langt i jorden, og der kan sikres god kontakt mellem frø og den fugtige jord.



## Gødning

Før såning bør jorden grundgødskes, så de nye græsplanter er sikret næring i den første tid. Det er vigtigt, at gødningen fordeles helt jævnt over arealet. Det anbefales at anvende NPK-gødning. Følg altid emballagens anvisninger, når du doserer gødning.



## Såning

I etableringsfasen er græsplanterne meget følsomme over for udtørring. Til såning er det derfor en fordel at vælge en periode, hvor jorden indeholder nogen fugtighed. Samtidig er det en fordel, at jorden er lun, mindst 10 grader, for det fremmer både spiring og rodvækst. Den bedste såtid er om foråret (marts-april) eller i sensommeren (august). Såning skal ske straks efter jordbehandlingen.

Ved såning om foråret vælger mange at så græsfrø med vårbyg eller havre som dæksæd. Kornet sås først, brug 80-100 kg pr. ha, efterfulgt af tromling. Dernæst sås frøblandingen. Dæksæden kan høstes som grønkorn eller helsæd til wrap/ensilage eller som modent korn.

Græsfrøene i sækken har forskellig størrelse, så for at få en jævn fordeling af store og små frø skal frøene blandes grundigt, før de sås. Rækkeafstanden skal være lille, så frøet fordeles så godt som muligt over hele arealet. Såning må ikke ske dybere end ca. 1 cm. Der skal sås 30-35 kg frø pr. ha.



## Første benyttelse

Når græsset er vokset godt til og er blevet 10-15 cm højt, er det klar til benyttelse. Da græsplanterne ikke har et stærkt rodnet, er det vigtigt at undgå for stor belastning af arealet – især i perioder med fugtigt vejr.



Første gang er det derfor en god ide at anvende marken til slæt (ensilage eller hø), da de unge planter ikke så godt tåler færdsel fra dyr, der græsser. Evt. afgræsning skal ske med forsigtighed på den nye græsmark, så dyrene ikke ødelægger planterne. Efter første anvendelse gødes marken igen, og når græsset er vokset til 8-12 cm, er den klar til normal afgræsning.



## Eftersåning

Udbytte og kvalitet falder i græsmarker med tiden, så det er en god ide at vedligeholde og holde liv i marken med eftersåning. Det skal ske f.eks. hvert 2. år - tidligt forår eller i august og med den samme blanding, som marken er tilsået med. Udsædsmængde 15-20 kg pr. ha.



## Strigling

I forbindelse med eftersåningen skal der ske en kraftig strigling af overfladen lige før eller samtidig med såningen. Striglingen fjerner dels eventuelle døde blade og andre plantedele, og der skabes et tyndt lag af løs jord, som kan danne såbed for de nye frø.



## Tromling

Eftersåningen afsluttes med tromling. Herved trykkes frøene fast mod jorden og vil spire lettere, fordi de er kommet i kontakt med den fugtige jord. Samtidig trykkes eventuelle sten tilbage i jorden.



## Vanding

Det er en god ide at foretage oversåningen i en fugtig periode eller forud for regnvejr. Hvis det er muligt, kan marken naturligvis også vandes efter såningen, men det bedste resultat opnås normalt med rigtigt regnvejr.



## Gødning

Marken gødes, når det nye frø er spiret frem. Her anvendes samme NPK-gødning som ved anlæg af ny græsmark. Følg anbefalingerne på emballagen ved dosering af gødning.



## Første benyttelse

Efter 4-6 uger er marken igen klar til brug. Start med forsigtig afgræsning, så dyrene ikke træder de spæde nye planter itu eller græsser dem så tæt ned, at planterne dør. Vær klar til at flytte dyrene efter nogle dages let afgræsning.



Du kan finde vejledning om etablering og vedligeholdelse af hestefolde på [www.dlf.dk](http://www.dlf.dk) under Produkter/Græs til heste.