



Ukrudtsbekæmpelse hvidkløver og rødkløver, humlesneglebælg, alsike, kællingetand og lucerne

- Kerb og Reglone er aktuel i de overvintrende bælgplanter
- Når vi har udsigt til en kold periode, kan midlerne udbringes
- Frost efter behandling øger effekten af Reglone
- Vær klar til at rykke ud, ofte er der kun få optimale dage at sprøjte i

December måned nærmer sig, og det er tid til en Reglone eller Kerb sprøjtning. Det lune efterår har medført gode vækstbetingelser for både afgrøder og ukrudt, så der vil i mange marker være behov for en behandling med Reglone i hele, eller dele af marken.

I hvidkløver og rødkløver er både Kerb 400 SC og Reglone godkendt. I de øvrige arter er Kerb 400 SC godkendt.

Kerb 400 SC

Kerb 400 SC er godkendt til de bælgseedsafgrøder, der er nævnt i overskriften.

Kerb kan kun anvendes, hvor der ikke er udlæg af frøgræs.

Kerb giver en god mulighed for at få bekæmpet græsukrudt, bla. agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, rajgræs, andre rapgræsser, vindaks, væselhale samt fuglegræs. Hæmmende virkning opnås mod bredbladede ukrudtsarter som burrenerre, agerstedmoder, ærenpris, hvidmelet gåsefod, liden nælde, pileurter m.fl.

Virksomheden er bedst ved god jordfugtighed og ved lav jordtemperatur

under 10 gr. C. Kerb kan evt. udbringes på let frosset jord fra december til februar. Kerb har systemisk effekt, optages gennem rødderne og blokerer følsomme planters celledeling. Doseringen er 1,0 l/ha. Der må maksimalt behandles 2,5 ha. pr. dag iflg. godkendelsen.

Reglone i hvidkløver

Reglone er godkendt til hvidkløver og rødkløver til frø.

Reglone kan anvendes fra december - februar, men sprøjt altid ved først givne lejlighed fra først i december. Der anvendes 2,0 l/ha med tilsætning af 0,1 % Lissapol.

I hvidkløver bekæmpes de fleste ukrudtsarter, men specielt er der god effekt på fuglegræs, agerstedmoder, ærenpris og mindre kamilleplanter samt spildkorn. Bedst effekt ved efterfølgende frost.

Er der udlagt engrapgræs i hvidkløveren, vil effekten overfor græsukrudt desuden være værdifuld i den efterfølgende frøafgrøde af engrapgræs. Vi har ikke andre alternativer til Reglone behandlingen i hvidkløver, med samme effekt mod ukrudt

Reglone i rødkløver

Anvendelse af Reglone i rødkløver kan ske som beskrevet for hvidkløver. Rødkløver behandles med Reglone fra slutningen af november.

Virkningsbetingelser for Reglone

Den bedste effekt af Reglone opnås ved

sprøjtning om formiddagen i klart vejr, gerne efter en frostperiode. Reglone er et kontaktmiddel, så der skal anvendes en relativ stor vandmængde, mindst 250-400 l vand pr. ha, laveste vandmængde hvis der er meget dug. Rim på bladene vil nedsætte effekten. Frost og/eller sne efter behandlingen øger effekten på ukrudtet.

Husk at tilsætte 0,1 % Lissapol.

Reglone optages hurtigt i bladene og hovedparten af midlet vil være optaget i løbet af 10 minutter efter udsprøjtning.

Doseringer

Anvend fuld dosis, 1,8-2,0 l/ha, af Reglone overfor tuer af alm. rapgræs, store planter af enårig rapgræs og kamille.

Fuglegræs og agerstedmoder kan normalt klares med 1,25 - 1,5 l/ha Reglone og spildkorn af byg med 0,8-1 l/ha. Hvedespildkorn kan bekæmpes med 1,5 l/ha Reglone, hvis der efterfølgende kommer frost.

Venlig hilsen
DLF-TRIFOLIUM A/S