

## Kvælstofnormer til markfrø høst 2012

Kilde: Plantedirektoratet, juli 2011,

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler, 2011/12

Frøart	Gammel norm kg/ha 2010/2011	Vejl. N-mængder kg/ha		Kvælstofnorm kg/ha 2011/2012
		Efterår	Forår	
1. års alm. rajgræs	134	0-40	110-150	133
2. års alm. rajgræs	134	0-40	130-155	133
Alm. rajgræs efterårsudlagt, 1. års	168	0-40	110-150	167
Italiensk rajgræs	105	0-40	85-100	104
Italiensk rajgræs efterårsudl. 1. års	139	0-40	85-100	137
Hybrid rajgræs	118	0-30	100-130	117
Hybrid rajgræs efterårsudl. 1. års	151	0-30	100-130	150
Westerwoldisk rajgræs	101	0	90-105	100
Timothe og knoldrottehale	92	0-30	30-100	92
Hundegræs	168	50-60	100-130	167
Engsvingel	101	30-40	60-80	100
Stivbl. svingel	118	60-70	50-60	117
Rødsvingel lange udl.	118	60-80	35-50	117
Korte og uden udløbere	118	60-80	45-60	117
Rajsvingel, festulolium	134	0	120-140	133
Strandsvingel	160	50-60	100-120	158
Krybhvene og alm. hvene	101	45-60	50-60	100
Alm. rapgræs	109	30	70-90	108
Engrapgræs marktype	126	60-75	65-75	125
Engrapgræs plænetype	134	60-75	70-80	133
Engrapgræs eft. kløver	126/134	45-60	60-80	125/133

N-normerne til græsfrø til høst 2012 er for de fleste arters vedkommende faldet med 1 kg N/ha.

Venlig hilsen  
DLF-TRIFOLIUM A/S