

Efterårsbehandling og udlæg af rajsvingel

- Efterårsbehandling
- Nyudlæg i renbestand
- Ukrudtsbekæmpelse i renbestands – og dæksædsudlæg

Puds stubben i udlægsmarken

Langt størstedelen af rajsvingel er foretaget i vårbyg i foråret. Hvis kornet er høstet med lang stub anbefaler vi en afpudsning af stubben efter høst, når man kan køre uden at lave spor i marken.

Behandling forud for 2. års høst

En lille del af rajsvingel høstes på 2. års marker. 2. års høst kan give et godt resultat, hvis marken kan få den rigtige behandling efter frøhøst.

Marker der oprindeligt er udlagt i renbestand er bedre egnede til 2. års høst end marker udlagt i vårbyg.

Afbrænding er bedst forud for 2. års høst, men kan sjældent praktiseres. Efter at halmen er fjernet, afpudses i bund (5 cm's dybde), således at gammel stub bliver afhugget. Dette er meget vigtigt, da der ellers er risiko for at der dannes vildskud fra knæene som aldrig bliver til noget. Der følges op med en eller to afpudsninger senere på efteråret.

Et alternativ er at gøde marken straks efter høst med 60-70 kg N/ha, og foretage et slæt ca. 1. oktober. Efter slættet tilføres 30-40 kg N, således at marken går vinteren i møde, med en ordentlig næringsstofbalance.

Afbrænding og slæt er begge effektive imod spildfrø, således at marken ikke bliver for tæt.

Er der ikke mulighed for en af ovennævnte metoder, er det nødvendigt med flere afpudsninger i løbet af efteråret, startende med en meget tæt afpudsning efter halmen er fjernet

Udlæg i renbestand

Vi har behov for et øget areal udlagt i renbestand til at dække behovet for rajsvingel til høst 2012. Såning i renbestand frem til en uge ind i september er forsvarligt, men om muligt sås udlægget sidst i august.

Erfaringerne viser, at der er færre problemer med sneskimmel i de efterårsudlagte arealer, som udbyttmæssigt normalt er fuldt på højde med de forårsudlagte arealer. Vær opmærksom på snegleangreb på de små planter.

Tilberedning af såbedet

Såbedets beskaffenhed er af stor betydning for fremspiringen af rajsvingel, men også for at undgå generende konkurrence fra spildkorn eller andet spildfrø, er det vigtigt, at tilberedningen af såbedet udføres korrekt.

Er forfrugten korn, bør der pløjes, så spildkornet ikke generer græsset i løbet af efteråret. Dette gælder også, når der er tale om vårbyg. For selv om vårbyg normalt vil fryse væk om vinteren, vil det konkurrere kraftigt med græsset i efteråret med deraf uoprettelig skade til følge.

Ved pløjningen skal der tages højde for, at forplove får det afskrællede materiale ned i bunden af furen, så kernerne ikke kan spire frem og genere.

Umiddelbart efter pløjningen pakkes jorden grundigt, og selve opharvningen skal være så øverlig som muligt for ikke at trække spildkerner op og for at sikre tilpas sådybde i god fugtig jord.

En god pakning af jorden mindsker også risikoen for senere snegleangreb.

Udsædsmængde

Planternes kortere udviklingsperiode ved såning i renbestand medfører en mindre buskning med deraf færre frøstængler pr. plante. Derfor bør udsædsmængden øges med ca. 20 pct. i forhold til udlæg i dæksæd.

Som udgangspunkt anbefaler vi 10 kg/ha. Sådybde 2-3 cm.

Gødskning

N-normer som gælder til høst 2012 er 133 kg N pr. ha. Vedr. gødningsnormer til slæt og afgræsning og regler i øvrigt henvises til Plantedirektoratets vejledning.

Ved såning ind i september er det tilrådeligt at give kvælstofmængde på 25-30 kg N pr. ha som udbringes ved såning.

Gødningen kan tilføres som NPK eller en ren kvælstofgødning.

Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel udlagt i renbestand

Der vil altid komme en kraftig fremspiring af ukrudt samtidig med græssets fremspiring.

I rajsvingel udlagt i renbestand er det vigtigt at få bekæmpet ukrudtet, mens det er småt. Nyfremspiret ukrudt kan bekæmpes med 0,2 l/ha Oxitril. Express kan anvendes med op til

1 tablet pr. ha når græsset har 2-4 blade. Express har bred effekt på mange ukrudtsarter, som f.eks. fuglegræs og kamille. Express eller Oxitril kan evt. kombineres med 0,05 - 0,1 liter DFF pr. ha. For at få en effekt på enårig rapgræs anvendes minimum 0,1 l/ha DFF, udsprøjtet under gode fugtighedsforhold. DFF er off-label godkendt til nyudlagt frøgræs.

Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel udlagt i vårbyg.

Express må anvendes om efteråret i frøgræs efter høst af dæksæd.

Er der kraftigt ukrudt vil det være formålstjenligt at starte bekæmpelsen af dette her i efteråret.

Der kan anvendes 1 tablet/ha Express mod specielt kamiller og fuglegræs. Er der agerstedmoder, tvetand og ærenpris, vil en kombination af 0,5-1 tablet Express og 0,05 l/ha DFF være en god løsning.

Venlig hilsen
DLF-TRIFOLIUM A/S