

Ukrudtsbekæmpelse i rødsvingel

- Hussar OD er aktuel i frømarken og udlægsmarkerne mod enårig rapgræs
- Løsninger til ukrudtsbekæmpelse i udlægsmarken og frømarken

Efter en lang vinter er foråret nu ved at indfinde sig med lidt højere temperaturer.

De grønne vintre, som vi gennem nogle år har haft, har givet sen fremspiring af græsukrudt, men i år har der været ro i frømarken vinteren igennem. Der kan være behov for en tidlig indsats mod enårig rapgræs for at få tilstrækkelig effekt.

Anvendelse af Hussar OD mod enårig rapgræs:

Hussar OD er et bladmiddel, så det enårige rapgræs skal have grønne blade inden udsprøjtning. Størst effekt af Hussar OD mod enårig rapgræs opnås ved tidlig sprøjtning og en tør periode efterfølgende.

Første års marker med meget enårig rapgræs:

Splitbehandling: Start ud med 0,04-0,05 l/ha Hussar OD tidlig i april. Opfølgning med 0,04-0,05 l/ha Hussar OD sidst i april. 2. sprøjtning kan evt. undlades, såfremt virkningen af 1. sprøjtning har været tilstrækkelig.

Marker med mindre mængde enårig rapgræs:

Vent på lidt mere ukrudtseffekt på 2-kimbladet ukrudt og kør med 0,05 l/ha Hussar OD i midten af april. Ud over effekten på enårig rapgræs virker Hussar OD også mod kamille, fuglegræs, hyrdetaske, raps, burrenerre, snerlepilurt, storkenæb, valmue, hvidkløver og vindaks og rajgræs

Vigtigt: Husk tilsætning af 0,5 l/ha Renol til Hussar OD når det anvendes alene. Sprøjt ikke på stressede planter. Der skal være lunt, over 9 °C, for at få bedst effekt af Hussar og udsigt til 6 timers tørvejrr efter sprøjtning.

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i frømarken

Primus kan bruges i frøgræsmarken mod kamille, burrenerre, valmue, raps og fuglegræs og virker ved temperaturer over 3°C. Doseringen af Primus i frøgræs er 0,05-0,075 l/ha for tidlige behandlinger.

Catch indeholder aktivstoffet i Primus samt 2,4 D og har en bred virkning mod ukrudt inkl. rodukrudt. Dosering 0,6 l/ha

Starane XL kan anvendes ved temperaturer på min. 5 °C med op til 1,5 l/ha. Primus og Starane XL kan kombineres med 0,05 l/ha DFF for at få bedre effekt mod ærenpris, stedmoder og tvetand.

Ariane FGS kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l/ha. I ældre marker kan anvendes op til 3,5 l/ha. Der sprøjtes, når temperaturen er over 15° C, og nattemperaturen er over 5-7° C. Effekten mod mælkebøtte, pileurter og skræpper kan forstærkes ved tilsætning af 0,3 l/ha Starane.

1,5 l/ha Ariane FGS + 0,05 l/ha Primus har i forsøg og praksis givet tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse. Kan sprøjtningen udsættes til sidst i april/først i maj, vil man ofte få en god effekt på tidsler.

Bekæmpelse af rodukrudt

MCPA kan anvendes mod skræpper, tidsler og andet rodukrudt. MCPA (og Ariane FGS) er ikke tilladt i frøgræs efter ærter. I 2. og 3. års marker samt marker udlagt i hvidkløver anvendes max. 1,33 l/ha MCPA. I 1. års marker udlagt i vintersæd/vårsæd må max. anvendes 0,7 l/ha MCPA. Husk stor vandmængde.

Bruges Hussar OD, Catch, DFF/Diflanil/Legacy, skal avler være i besiddelse af off-label vejledning som kan findes på vores hjemmeside http://www.dlf.dk/Avlerservice/Off_label_vejledninger.aspx

Bekæmpelse af kvik og grove græsser

Den ordinære indsats mod grove græsser skal vente til maj. Vi vender tilbage med flere oplysninger om bekæmpelse af grove græsser og vækstregulering i den næste FrøavlsInfo.

Nyudlæg i ærter:

Der anvendes **Stomp + Fighter 480** eller **Basagran M75**. Der sprøjtes med ca. 10-14 dages mellemrum med 2 x (0,5-0,75 Stomp + 0,4-0,5 Fighter 480), eller 2 x (0,5-0,75 Stomp + 0,75 Basagran M75).

1. sprøjtning udføres, når ukrudtet er på kimbladsstadiet, uanset størrelsen af ærter og rødsvingel. 2. sprøjtning, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet 10-14 dage efter.

Ved anvendelse af Stomp er det vigtigt, at frøene af rødsvingel er dækket af jord.

Nyudlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af rødsvingel. Vælg en kombination af midler som passer til det ukrudt der findes i marken. Oxitril, Express, DFF, Primus, Starane XL og Catch kan indgå i ukrudtsbekæmpelsen.

Blandingen **0,3 l/ha Oxitril + 0,5 tab. /ha Express +0,05 l/ha DFF** har en god bred effekt.

Primus (0,075 l/ha) har god effekt på kamille, burresnerre, valmue, raps og fuglegræs, og den kan bruges ved lave temperaturer.

Express (op til 1 tab./ha) + spredemiddel, anvendes evt. i tankblanding med Oxitril eller Starane når ukrudtet har 0 - 4 blade og udlægget fuldt fremspiret med 2 - 3 blade.

Oxitril (0,2-0,4 l/ha) + Starane (0,4 l/ha) kan ved splitbehandling anvendes i sidste sprøjtning mod burresnerre, pileurt og hanekro.

Oxitril (0,2-0,4 l/ha) + DFF (0,05 l/ha) kan ved splitbehandling anvendes i sidste sprøjtning mod ærenpris, stedmoder og tvetand.

Venlig hilsen

DLF-TRIFOLIUM A/S

Catch (0,25-0,6 l/ha) har en bred virkning mod ukrudt inkl. rodukrudt.

MCPA kan anvendes mod rodukrudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med op 1,33 l/ha i vårbyggens stadium 30-39. Husk stor vandmængde.

Primera Super kan anvendes mod flyvehavre, vindaks og alm. rapgræs med 0,8 l/ha.

Enårig rapgræs.

DFF virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Doseringen af DFF hæves til 0,1 l/ha, hvis der er meget enårig rapgræs. Alternativt kan 1,0 l/ha Stomp anvendes. Det er vigtigt ved anvendelse af DFF eller Stomp, at græsfrøene er sået, dvs. dækket med mindst 1 cm jord, idet midlerne ellers kan skade.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l/ha. Ud over en bred effekt mod bredbladet ukrudt, er der også effekt mod enårig rapgræs, vindaks og rajgræs.

Aks- og strånedknækning af vårbyggen kan forebygges ved sortsvalg. Er der alligevel behov for vækstregulering kan det ske med 0,2-0,4 l/ha Moddus.

Udlæg i vintersæd-opfølgning i foråret:

Express kan anvendes mod nyfremspiret ukrudt med 1 tablet + spredemiddel, evt. i tankblanding med 0,05 l/ha DFF mod stedmoder, ærenpris og tvetand eller med 0,3 l/ha Starane mod burresnerre mm. Er der mange burresnerre eller kamille, kan 0,05-0,075 l/ha Primus eller 1,0 l Starane XL også være en løsning.

Topic kan anvendes midt i april med op til 0,4 l/ha + olie i vinterhvede. Her bekæmpes alm. rapgræs, agerrævehale rajgræsser, flyvehavre og vindaks.

Lexus kan anvendes med 10 - 15 g/ha mod agerrævehale.

Hussar (0,05 l/ha) + olie kan anvendes mod enårig rapgræs, vindaks og alm. rajgræs samt bredbladet ukrudt.

Primera Super anvendes mod flyvehavre, agerrævehale og vindaks i dæksæden med 0,8-1,0 l/ha, og der tilsættes 0,2 l/ha Isoblette