



Ukrudtsbekæmpelse i sneglebælg

- **Fighter 480 og Stomp er off-label godkendt.**
- **Fighter 480 er eneste mulighed for kemisk bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i frømarken**
- **Resten må klares med weedwiper eller håndkraft**
- **Hold øje med bladrandbiller ved ukrudtssprøjtning i nyudlæg**

Udlæg i vårbyg af sneglebælg

Fighter 480 og Stomp er off-label godkendt i humlesneglebælg til frø, så dermed er det tilladt at anvende i udlægsmarken.

Bedst effekt af Fighter 480 opnås i "grødevejr", dvs. høj luftfugtighed, klar sol og temperaturer på 15-20°C.

Stomp er mindre temperaturafhængig og virker bedst ved god jordfugtighed. Når der anvendes Stomp, skal frøene være dækket af jord.

Ukrudtsbekæmpelsen udføres normalt som en splitbehandling.

Sprøjtetidspunkt og dosering

1. Sprøjtning med 0,4 l/ha Fighter 480 + 0,5 l/ha Stomp på ukrudtets kimbladstadiet.
2. Sprøjtning 5-7 dage efter med 0,5 l/ha Fighter 480 + 0,5 l/ha Stomp

Der kan tilsættes op til 0,5 l/ha olie ved en vandmængde på 150-250 l, for

at forøge ukrudtsmidlernes indtrængning i planterne. Olietilsætning er især aktuelt under tørre sprøjteforhold og på ukrudtsplanter med tykt vokslag.

Første sprøjtning udføres, når ukrudtet står på kimbladsstadiet, og de fleste sneglebælgplanter har udviklet et spadeblad. 2. sprøjtning udføres fra en til to uger senere, når der er fremspiret nyt ukrudt.

Ukrudtseffekten af ovenstående splitsprøjtning dækker kamille, haremåd, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, agersennep, raps, burrenerre, stedmoder, ærenpris, valmue og tvetand.

Primera Super + 0,2 l Isoblette pr. 100 l vand er godkendt til bekæmpelse af flyvehavre i vårbyg med 0,8 l/ha når flyvehavren har 3-4 blade og byggen har max. 5 sideskud

Skadedyrsbekæmpelse.

Allerede i fremspiringsfasen er det vigtigt at holde øje med bladrandbiller, der hvis de ikke bekæmpes, er i stand til at bortgnave fremspirende sneglebælgplanter. Der skal sprøjtes så snart man finder de karakteristiske "billetklip" i bladene. Bekæmpelse foretages med et pyretroid. Angrebet sætter normalt ind fra foragre - specielt hvis nabomarken er en mark med etablerede bælgplanter.

Ukrudtsbekæmpelse i sneglebælg til høst 2010

Nyfremspiret kamille, storkenæb og fuglegræs kan forsøges bekæmpet med Fighter 408 tilsat olie som beskrevet under udlægsmarken. Behandlingen foretages i grødevejr. Store, veletablerede kamiller og storkenæb kan ikke bekæmpes. Off-label godkendelsen af Fighter 480 rækker ikke til de 2-3 l/ha som er nødvendig dosering for at få rimelig effekt på storkenæb og halvstore kamiller.

Skræpper, silene (pragtstjerne) og spildraps kan, for en stor del, bekæmpes med en traktortrukken weedwiper når planterne strækker sig i juni måned, idet de alle tre normalt vil være noget højere end sneglebælgen.

Venlig hilsen
DLF-TRIFOLIUM A/S

Bekæmpelse af græsukrudt

Der er p.t. ingen godkendte løsninger til bekæmpelse af græsukrudt om foråret i sneglebælg. Således har vi kun Kerb til bekæmpelse af græsukrudt i sneglebælg.

Bruges Fighter 480 eller Stomp, som har off-label godkendelser, skal avler være i besiddelse af en vejledning, som kan findes på vores hjemmeside http://www.dlf.dk/Avlerservice/Off_label_vejledninger.aspx