

Høst af sneglebælg

Nu nærmer høsten sig, og man skal begynde at holde øje med sneglebælg. Modningen er kendetegnet ved, at hovedparten af bælgene er sorte, og frøene er hårde. En tommelfingerregel siger, at to tredjedele af bælgene skal være sorte. En tvemoden afgrøde må ikke høstes for sent, da afgrøden er ret spildsom, når den først er moden.

Skårlægning

Sneglebælg skårlægges normalt. Dette sker med slåmaskine. En skivehøster er ikke velegnet, da den normalt vil være for hård ved afgrøden. Der kan anvendes en selvkørende skårlægger, men det skal tages i betragtning, at et sådant skår vil være længere tid om at vejre igennem.

Det kan lade sig gøre, at tærskes sneglebælg direkte. Men det anbefales normalt kun, hvor modningen er sket meget ensartet og alle frøene har skiftet farve.

Tærskning

Sneglebælg spirer meget let i skåret, hvorfor det er vigtigt at tærskes så snart

skåret er afvejret. Dette vil normalt være tilfældet efter 8-10 dages vejring. Under normale vejrforhold vil det sædvanligvis være muligt at tærskes varen lagerfast, dvs. med et vandindhold under 12 %. Det er vigtigt, at man tærsker afgrøden så nænsomt, at den sorte bælg omkring frøet bliver siddende på, da det letter den senere rensning.

Skadedyr og sygdomme i udlægsmarker

Efter høst af dæksæden er det en god ide at se efter angreb af bladrandbiller. Disse kommer fra afhøstede ærte-, kløver- og sneglebælgarealer. I tilfælde af kraftig invasion kan løvet blive kraftigt bortgnavet. Billernes larver ernærer sig desuden af bælgplantens bakteriekolde på rødderne, og dette kan medføre, at udlægget går til. Bekæmpelse foregår med et pyrethroid.

Sneglebælg kan angribes af bægersvamp og sneskimmel. Derfor bør et kraftigt udlæg afpudsnes i september, hvorved risikoen for angreb mindskes

Venlig hilsen
DLF-TRIFOLIUM A/S