



Etablering af strandsvingel

- **Strandsvingel igen på udlægsplanen**
- **Udlæg i ærter og byg sikker metode**
- **Strandsvingel skal sås, ikke drysses**

Udlæg af strandsvingel

Markedssituationen er på vej mod en bedring i strandsvingel. Efter et par år med overforsyning og små høstarealer er lagerkurven knækket, og forsyningsbalancen er på vej til at blive rettet op. Forbruget er fornuftigt, hvilket betyder, at vi dette forår skal udlægge strandsvingel på et mere normalt niveau igen til høst 2012.

Et godt resultat starter med etableringen

Strandsvingel lykkes, på trods af navnet, bedst på lermuldede jorder i god kultur. Sandmuldede jorder er mindre egnede til frøproduktion af strandsvingel, da udbytteneiveauet på sådanne jorde er væsentlig lavere.

Af ukrudtsarter der ikke lader sig rense fra strandsvingel kan nævnes *kvik*, *rajgræs*, *rødsvingel*, *blød hejre* og *agerrævehale*. Ukrudtsarter der vanskeligt lader sig fræse er *enårig* og *alm. rapgræs*, *væselhale*, *kamille*, *skræppe* og *haremad*.

Frøvægten for strandsvingel varierer mellem 1,8-2,0 gram pr. 1000 frø.

Der udsås 6-8 kg strandsvingel pr. ha. Der tilstræbes en plantebestand på 100-125 planter pr. m², men hvis planterne er jævnt fordelt, kan 50-60 planter pr. m² være tilstrækkeligt.

Såning af frøet skal ske straks efter såning af dæksæden. Der sås i 1-2 cm dybde, og det er vigtigt, at frøene får kontakt med fast og fugtig jord.

Tromling sker straks efter såning, så såbedets kapillære effekt sikrer fugtighed til frøet.

Udlæg i ærter

Bedste metode her i foråret er udlæg i ærter. Både fordi ærterne giver plads og lys til udlægget, og fordi ærter er en glimrende forfrugt til den kvælstofglade strandsvingel. Forudsætningen for et godt resultat er såning i et godt såbed og ikke for dybt. Anvend en ærtesort som er stråstiv frem til høst, f. eks. Pinocchio.

Ved udlæg i ærter skal der sås mellem 50 og 55 planter pr. m² af ærterne. Såning af strandsvingel med frøsåkasse kan praktiseres, hvis det bliver efterfulgt af en tromling. Det er vigtigt at passe på sådybden af frøet, idet ærter ofte sås efter en dyb opharvning.

Ved såning af ærter og strandsvingel hver for sig, bør der tromles inden såning af strandsvingel frøet. Pas på at jorden er tjenlig for at undgå senere strukturproblemer.

Udlæg i vårbyg

Vælg så vidt muligt en stråstiv vårbyg (maltbyg) med lav tendens til aks- og strå nedknækning.

Der er stor forskel på bygsorternes egenskaber til udlæg, se evt. mere om sorterens egenskaber på www.sortinfo.dk

Byggen skal ikke gødes for kraftig, og man skal for alt i verden undgå lejesæd, da det er den sikre død for udlægget.

Rækkeafstand og sådstyr

En forudsætning for et vellykket udlæg af strandsvingel i vårbyg, er at korn og frø sås med hver 2. tragt, hvilket giver de enkelte planter mere lys og plads og generelt bedre udviklingsmuligheder.

Dette system fungerer også meget fint i praksis med minimale ompløjningsprocenter som resultat.

Ved at etablere en kraftig stribe med hhv. byg skiftevis med en kraftig stribe af udlæg, bliver der også ydet en kraftig konkurrence mod enårig og alm. rapgræs, som kan være problematisk i

strandsvingel, såfremt jorden er stærkt inficeret med disse arter.

Anvendes frøsåkasse, kan man lade slangerne fra denne gå ned i de bageste tragte eller lige bagved, således at kornet sås med de forreste tragte og frøet med de bageste. Sådybden kan styres ved at vippe maskinen forover, eller slække de bageste tragte.

Blanding af frø og korn og udsåning sammen anbefales ikke, da risikoen for at frøet bliver sået for dybt er for stor.

Venlig hilsen
DLF-TRIFOLIUM A/S