



Efterårsbehandling i strandsvingel

- Efterårsbehandling og gødskning
- Ukrudtsbekæmpelse
- Nyudlæg

Situationen i marken

Høsten af strandsvingel er stort set overstået, og de foreløbige udbytteindikationer er positive. Nu bliver det spændende at se om de nye udlægsmarker har udviklet sig tilfredsstillende.

Efterårsbehandling forud for 1. høstår

Når dæksæden er høstet og halmen fjernet, er afpudsning af stubben en af de første ting der skal ske. Det er vigtigt at de nye planter busker sig mest muligt, og dette opnås ved at afpudse i en højde på ca. 5 cm. Ved afpudsning reducerer man stubbens skyggevirksomhed, så der kan komme mest mulig lys ned til de små planter. Udlæg sået i vintersæd kan have lange slaskede blade, og ved afpudsning af disse stimulerer man planten til at sætte nye friske blade og sideskud

Det er naturligvis en fordel, at man sætter så lav stub som muligt med mejetærskeren. Hvis man har sat høj stub, er det naturligvis endnu vigtigere hurtigst muligt at få afpudset. Er der mere materiale end at det kan forsvinde mellem udlægsplanterne, bør dette efter et par dages tørring, rives sammen og fjernes.

Til svage nyudlæg anbefales at tilføre 30 kg N/ha hurtigt efter høst.

Strandsvingel efter 1. års høst.

I strandsvingel er afbrænding af frøgræshalmen en udmærket foranstaltning, men i år har mange valgt at fjerne eller snitte halmen. Den snittede halm bidrager til at holde kvælstoffet fra halmen i marken. Hvis halmen ikke er

brændt af, er en tæt afpudsning aktuel nu. Hvis halmen er snittet, vil en dyb afpudsning (2-3 cm) af stubben også være med til at sørge for en findeling og fordeling af halm og stubrester, således at det kan forsvinde ned mellem planterne og blive omsat. Kør gerne lidt på sned med pudseren, det vil fordele den snittede halm bedst.

I kraftigt voksende sorter med stor grønmasse produktion kan en gødskning med 75-90 kg N/ha lige efter høst være aktuel, hvis man har afsætning for et slæt omkring 20. september.

Strandsvingel med de stive blade og den oprette vækst skal ikke holdes så kortklippet om efteråret som f.eks. engrapgræs og kan uden problemer gå vinteren i møde med en bladlængde i det sene efterår op til 20 cm.

Omkring første uge af oktober afpudses for sidste gang i 10-12 cm højde.

Afgræsning med får kan være et udmærket alternativ til mekanisk afpudsning. Sen afgræsning (november) må ikke efterlade græsset i mindre end 6-8 cm's højde.

Gødskning

Der gødes først i oktober med ca. 60 kg N/ha. Er der udlagt i ærter nedsættes mængden til ca. 40 kg N/ha. I svage udlægsmarker efter vårbyg vil det være en fordel at udbringe gødningen i starten af september.

I 2. års marker gødes efter afpudsning omkring 1. oktober. Ved høje P og K tal kan der anvendes en ren kvælstofgødning. Ved lave tal anvendes NPK gødning. Svovl skal ikke tilføres om efteråret, men først til foråret.

Gødningsnorm til strandsvingel høst 2012:

158 kg/ha. Mængderne er total efterår + forår

Udnyttes marken til efterslæt eller afgræsning er der mulighed for at tilføre kvælstof til dette. Vedr. gødningsnormer til slæt og afgræsning og regler for dette henvises til Plantedirektoratets vejledning.

Gylle kan anvendes når fordelingen er optimal og det nøjagtige kvælstofindhold kendes. Der kan regnes med en 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammonium-kvælstof. Husk at gyllen skal være udbragt inden 15. oktober på frøgræsmarker.

Ukrudtsbekæmpelse (2-kimbladet ukrudt)

Express og DFF er off-label godkendt til brug om efteråret i strandsvingel.

Express må anvendes frem til den 30. september i en dosering på 1 tablet pr. ha. Er der kraftigt ukrudt som har overlevet i dæksæden, vil det være formålstjenligt at starte bekæmpelsen af dette her i efteråret. Der kan anvendes 1 tablet Express pr. ha mod specielt kamiller, kornvalmuer og fuglegræs. Husk spredemiddel. Er der agerstedmoder, tvetand og ærenpris, vil en kombination af 1 tablet Express og 25-50 ml DFF pr ha være en god løsning. Højeste DFF dosering ved stort ukrudt.

Alternativt kan en kombination af 0,2 l/ha Oxitril og 25-50 ml DFF anvendes mod ukrudt der ikke er blevet for stort.

Græsukrudt og spildkorn

Agil er off-label godkendt mod spildkorn og græsukrudt med 0,12 l/ha i strandsvingel udlagt i dæksæd. Tilsæt Lissapol. Sprøjt så tidlig som muligt efter spildkornet er fremspiret. Stomp er off-label godkendt med 1,2 l/ha og har nogen effekt mod rapgræs og væselhale. Udsprøjtes i august på fugtig jord før ukrudtets fremspiring.

Se oversigt over off-label godkendelser på vores hjemmeside

http://www.dlf.dk/Avlerservice/Off_label_vejledninger.aspx

Udlæg af strandsvingel til høst 2013-14

Etablering af strandsvingel til høst første gang i år 2013 kan ske her i efteråret i vintersæd eller til foråret i ærter og vårbyg. Udlæg om foråret er den foretrukne metode hos langt de fleste.

Ærter er en fantastisk god dækafgrøde for strandsvingel, men også udlæg i hvede eller vårbyg på dobbelt rækkeafstand har givet nogle gode udlæg.

Undertiden kan strandsvingel udvikle sig kraftigt i hvede, specielt ved tidlig såning. Udlæg i vinterbyg kan også praktiseres. Græsukrudtsproblemer bliver i reglen også større hvis udlæg sker i vintersæd.

Ved udlæg i hvede sås strandsvingelen straks efter hveden, gerne i samme arbejdsgang, og der sås 6-8 kg pr. ha i en sådybde på 1-2 cm.

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd

Den mest oplagte løsning er Oxitril i doseringen 0,2 l/ha når ukrudtet er fremspiret. DFF kan tilsættes i doseringen 25 ml pr. ha.

Ønskes en effekt på enårig rapgræs, hæves doseringen af DFF til 100 ml/ha.

En opfølgende sprøjtning til foråret må påregnes. Der må ikke anvendes nogen former for græsmiddel ved udlæg af strandsvingel.

Venlig hilsen
DLF-TRIFOLIUM A/S