

Erling Christoffersen  
Avlschef, Højme

# Behov for yderligere arealer af plænerajgræs til høst 2011

Efter et par år, hvor vi har været nødsaget til at skære ned i frøarealerne på grund af lavere forbrug, er der nu et lyspunkt i situationen for plænetyper af almindelig rajgræs. En god afsætning i foråret betyder, at markedet forventes væsentligt forbedret for høsten 2011. Vi har derfor mulighed for at øge vores udlæg af plænerajgræs.


Hvor vi er fuldt regnet i fodersorter af almindelig rajgræs foder, både diploide og i tetraploide, er der stadig mulighed for at tegne rajgræs af plænesorterne til udlæg i renbestand, og dermed til høst allerede i 2011.

## Moderne plænetyper er tidlige og højtydende

I de senere år har DLF-TRIFOLIUM skiftet sortimentet af plænerajgræs ud, således at vi i dag har nogle sorter, der modner i slutningen af juli. Samtidig er sorterens udbyttensiveau hævet. En tidlig høst betyder som regel en nemmere høst, som er overstået, inden kornhøsten begynder.

## Såning i renbestand giver samme udbytte som såning i vårbyg

Da en stor del af det, der skal sås i renbestand, er plænesorter, har vi set på, hvilke udbytter der er opnået i marker udlagt i renbestand sammenlignet med marker udlagt i vårbyg i de sidste 5 år. Vi har kun sammenlignet plænesorter, og i figuren ses, at der ikke er forskel i udbytte.



## Såning i renbestand

Normalt er det ca. 20 pct. af vores rajgræs, der udlægges i renbestand, men det bliver mere i år. For at renbestandsudlæg skal lykkes, er rettidig såning meget væsentligt. Rettidig såning vil sige i august måned, og jo tidligere jo bedre. I alle tilfælde skal man sørge for at tilberede et godt såbed, og en omhyggelig såning i tilpas sådybde på 2 cm.

Ved såning efter korn er det vigtigt, at spild minimeres. Der pløjes grundigt, så spildkorn bliver placeret i furebunden, og derved ikke spirer frem sammen med græsset. Dette gælder også vårbyg, som kan give en hård konkurrence i efteråret.

I år vil der være en del frøavlere, der vil så rajgræs efter vinterraps. Dette vil give mulighed for tidlig såning, og man slipper for spildkorn i marken. Såning af rajgræs efter raps kan ske med eller uden pløjning. En anden måde at opnå tidlig såning er at så rajgræs efter rajgræs, hvilket selvfølgelig kræver, at man sår samme sort, og at marken er fri for kvik.

Ved såning efter raps og frøgræs skal man være ekstra opmærksom på snegle.

## Kvælstofgødsning

For almindelig rajgræs sået i renbestand er kvælstofnormen 169 kg/ha. Dette skyldes, at det ofte er nødvendigt at give ca. 30 kg N pr. ha i efteråret i forbindelse med såning, så rajgræsset udvikler sig tilpas i efteråret. Ved tidlig såning, f. eks. efter raps, kan efterårsgødsning undlades eller reduceres, og derved har man mulighed for at gøde ekstra om foråret.

## Ukrudtsbekæmpelse

I de senere år har vi set gode resultater af forskellige græsmidler anvendt i efteråret. Der er opnået en del off-label godkendelser, så der er gode muligheder for at holde markerne rene for tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Enårig rapgræs bekæmpes med DFF og/eller Stomp, og vindaks med Boxer. Tokimbladet ukrudt bekæmpes med Oxitril og /eller Express. Nærmere detaljer om dette udsendes i FrøavlsINFO. Specielt græsmidternes virkning er meget afhængig af korrekt tidspunkt og jordfugtighed.



Almindelig rajgræs Neruda plænesort sået efterår 2008 og behandlet med Oxitril og DFF efterår mod tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs. Billedet er taget forår 2009. Udbytte 2009: 1500 kg/ha