

# Efterårsbehandling på skemaet



Af Vera Jacobsen  
Frøavlskonsulent  
DLF-TRIFOLIUM A/S

Efter frøhøst kommer opgaverne bare væltende: Kornhøst, halmbjærgning, etablering af vinterraps, såning af vintersæd osv. Undervejs i travlheden er det vigtigt at give sig tid til den rigtige pasning og pleje af frømarken. Næste års udbytte bliver nemlig i høj grad grundlagt i efteråret. Tre ting er værd at fremhæve. Nemlig pleje af nyudlæg, afpudsninger efter 1. års høst og gødskning med gylle. En rettidig og omhyggelig indsats her vil gøre hele forskellen mellem de gode og de mindre gode frømarker.

## Nyudlæg

I nyudlæg er det vigtigt straks efter høst af dæksæden at sørge for lys og luft til de spæde planter. Det gøres ved, at halm- og stubrester afpudsnes og fordeles. Planteantallet skal være i orden, og der må ikke være huller i bestanden. 50-60 kraftige planter pr. kvm jævnt fordelt er tilstrækkeligt i de fleste arter.

Har der i dæksæden været væselhale, skal man være ekstra kritisk. Især på forlandet og hvor dæksæden overlapper i kiler og lignende, kan frøgræsset være udkonkurreret. Her vil væselhale kunne etablere sig. To behandlinger med 2 l Stomp er en nødløsning, som ikke er særlig effektiv. Yderste konsekvens må være at ompløje udlægget og satse på en ny kontrakt.

Svage nyudlæg kan med lidt ekstra omsorg i form af 30 kg N indhente det forsømte. Det er meget vigtigt, at tildelin-

Det er tid til at kigge på, hvad der er vigtigst at få gjort i efteråret for, at frøavlens skal lykkes

gen sker så hurtigt som muligt. Gylle er meget velegnet til at give denne førstehjælp. Udlæg i vårsæd har haft kortere tid til at etablere sig end udlæg i vintersæd. Derfor er det oftest disse marker, der kræver ekstra opmærksomhed.

## Afpudsning

Det er helt uundværligt at bruge afpudsning til trimning af frømarken før 2. års høst. Den bedste løsning for rødsvingel og engrapgræs er dog afbrænding. I rødsvingel kan afbrænding stadig nås, men det haster. I engrapgræs, der skal høstes 2. eller 3. år, er afbrænding mulig indtil midten af september.



Afpudsning til 2-3 cm's dybde lige efter høst

For øvrige arter anbefaler vi en tilbunds gående afhugning lige efter høst. Følg op med en til afpudsninger senere i efteråret. Sidste gang midt i oktober. Denne afsluttende afpudsning bør ikke

være dybere end 8-10 cm.

I strandsvingel og hundegræs er der efterhånden mange, som snitter halmen. Gentagne afpudsninger er her med til at findele og sprede det afpudsede materiale.

## Gødskning.

De almindelige efterårstildelinger af kvælstof (se skemaet) bør ske efter sidste afpudsning i oktober.



Gyllestriben

Også her vil husdyrgødning i alle arter være velegnet til at dække behovet. Det er dog en betingelse at kende det nøjagtige indhold af kvælstof i gyllen. Og det er vigtigt, at gyllen er velomrørt, så fordelingen i marken bliver tilfredsstillende. Alt for ofte ses "gyllestriben" langt hen i efteråret og vinteren.

| Efter høst af | Dæksæd                  | Rødsvingel          | Engrapgræs             | Strandsvingel  | Hundegræs                             |
|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Afbrænding    | Ikke muligt             | Senest medio august | Senest primo september | Ikke muligt    | Ikke muligt                           |
| Afpudsning    | 5 cm's dybde            | 2-3 cm's dybde      | 2-3 cm's dybde         | 3-5 cm's dybde | 5-8 cm's dybde                        |
| Gødskning     | 30 kg N til svage udlæg | 60-80 kg N          | 60-75 kg N             | 50-60 kg N     | Evt. 70 kg N til efterslæt 50-60 kg N |