



Høst af timote

- **Hold daglig tilsyn med timote i modningsperioden**
- **2 ugers vejringstid optimalt**
- **Behandling af frømarken efter høst**

Timote modner noget uensartet og er meget spildsom, og dette skal der tages hensyn til ved valg af høstmetode.

Da den sidste fase af modningen forløber meget hurtigt, er dagligt tilsyn nødvendigt i modningsperioden.

Når afgrøden når skårlægningstidspunktet, får marken et gult til gulbrunt skær, bladene visner, og frøene bliver voksagtige. Duskene bliver gråbrune, og i ca. halvdelen af duskene sidder frøene i den øverste ½ - 1 cm løse eller er faldet af.

Ved et let slag af toppen i hånden falder de første frø af. Ved fuldmodenhed sidder frøene meget løse, og selv en svag blæst kan forårsage et stort dryssespild.

Derfor kræver en timote frømark meget tilsyn i dagene op til skårlægning.

Skårlægning

Timote har nogle kraftige, grove strå, og går derfor ikke i leje på samme måde som f.eks. alm. rajgræs.

Det voldsomme vejr vi har haft for nylig, har dog tvunget de fleste marker i knæ, så kun den øverste del af strået rejser sig. Denne egenskab er forstærket i marker der er vækstreguleret.

Da timote er meget spildsom, er skårlægning den bedste høstmetode.

Skårlægningen foretages med selvkørende skårlægger. Denne samler skåret i et forholdsvist tykt skår, der er i stand til at hindre gennemgroning, og

opfange spildfrø. Skåret bør ikke være for tyndt, da frøene så let falder igennem, ligesom genvækst i marken hurtigt vil gro igennem skåret.

Modsat vil meget kraftige skår kræve uhensigtsmæssig lang vejringstid.

Af hensyn til en god og ensartet vejring, anbefales det at afsætte en stubhøjde på 10-15 cm ved skårlægning.

Tærskning

Timote kræver normalt mindst 14 dage på skår, inden afgrøden er færdigvejret. En tilstrækkelig lang vejringstid er en forudsætning for at kunne foretage en god udtærskning uden unødvendig hård behandling.

Tærskes frøet allerede efter 8-10 dages vejring, er der risiko for at påføre de umodne frø tærskeskade med nedsat spireevne til følge.

Ved tærskning må broafstand og cylinder-hastighed afpasses efter afgrøden. For hård tærskning kan give et stort indhold af afskallede frø med vægttab og nedsat spireevne til følge.

Opsamling af skåret kan ske med akshævere eller pick-up.

Ønskes yderligere oplysninger om indstilling af mejetærsker m.m. kan vi henvise til vores nye udgave af "Værd at vide om frøtærskning", som kan fås ved henvendelse til avlskontoret eller den kan hentes fra vores hjemmeside.

Råvarekvalitet

10 liter råvare skal veje omkring 4 kg for at få et tilfredsstillende lavt rensesvind på ca. 15 pct.

Dette er en grov rettesnor, som ikke gælder, hvis der i frøet er unormalt stort

indhold af f.eks. enårig rapgræs eller spildkorn.

En 10 liter spand (strøget mål), som er meget anvendelig til at måle råvarevægten, fås ved henvendelse til din frøavlskonsulent

Efterbehandling

Efterbehandling på plantørreri er absolut nødvendigt, hvis afgrøden ikke er færdig-vejret, eller hvis der tærskes under ugunstige vejrforhold. Selv færdigvejrede og tilsyneladende tørre partier skal beluftes for at sikre spireevnen og lagerfastheden. Der beluftes med kold luft straks efter høst i nogle dage, derefter tilsættes varme for egentlig nedtørring, hvis der er behov herfor.

Frøet er lagerstabilt ved en vandprocent omkring 12 pct.

Behandling af frømarken efter høst

Efter 1. og 2. års frøhøst afbrændes halmen straks efter frøhøst, hvis ikke halm og genvækst skal udnyttes.

Der skal forud for afbrænding laves et

brandbælte på 10 m, hvor halmen er fjernet, og der er pløjet, harvet eller fræset. Hvis marken støder op til roer, græs eller pløjemark, er det ikke nødvendigt med brandbælte. Påbegynd afbrændingen mod vindretningen. Afstand til brandbare afgrøder og bygninger med hårdt tag skal være min. 30 m. Afstand til bygninger af træ, bygninger med let antændelig tag, nåletræ, lyng mm. skal være min. 100 m. Vi har også gode erfaringer med at snitte halmen fint direkte fra mejetærskeren, dog kræver dette at den finsnittede halm fordeles jævnt ud over arealet.

Hvis timotehalmen skal bjærges, bør stub og genvækst afpudsес dybt (2-3 cm) lige efter høst.

Ønsker man at anvende afpudsningen, kan man efter høst gøde med 50 kg N pr. ha og igen med 25 N pr. ha efter afgræsning eller afhøstning.

Afpudsning af genvæksten foretages i begyndelsen af oktober, og kvælstoffet tilføres umiddelbart herefter.

Venlig hilsen

DLF-TRIFOLIUM A/S