

Udlæg af græsmarker om foråret



Valg af blanding

Alle frøblandinger er egnede til udlæg om foråret både i renbestand og med dæksæd. Dog bør man være opmærksom på, at blandinger uden et væsentligt indhold af rajgræs ofte vil spire langsomt frem og derfor er bedst egnet til udlæg i dæksæd.

Udlæg i renbestand

Ved såning af kløvergræsblandinger uden dæksæd er det muligt at opnå en meget god etablering og en meget høj foderværdi i afgrøden. Udlæg af kløvergræsblandinger uden dæksæd lykkes bedst når der er god fugtighed i det øverste jordlag eller der evt. kan vandes. Etableringen skal helst ske tidligt, og der skal være kvælstof til rådighed i fremspiringsfasen. 1. slæt vil være klar i begyndelsen af juli.

Udlæg i dæksæd

Udlæg i vårsæd er den velkendte metode til etablering af græsmarker. Den bør foretrækkes hvor der er problemer med at få et perfekt, jævnt såbed; hvor der er risiko for jordfygning eller hvor der forventes vanskeligheder med store mængder ukrudt. Dæksæden kan være grønbyg eller grønærter, som begge kan give høj foderværdi. Helsæd vil ofte give noget tungere fordøjeligt foder. Såning af 5-10 kg italiensk rajgræs sammen med udlægget har vist sig også at være en god metode.

Konklusion:

- Ø Ved udlæg uden dæksæd om foråret skal såbedet være helt jævnt og ensartet opharvet
- Ø Bedste såtid er tidligst muligt og der skal sikres god forsyning med såvel kvælstof som vand
- Ø Udsædsmængden skal være ca. 30 kg pr. ha
- Ø 1. slæt høstes sammen med 2. slæt i overvintrende marker i første halvdel af juli
- Ø Ved udlæg i dæksæd skal såbedet være jævnt og ensartet, så frøet kan placeres på fast bund
- Ø Dæksæden sås tyndt, så lejesæd undgås
- Ø Udsædsmængden skal for udlægget være ca. 25 kg pr. ha
- Ø Dæksæden sås først - dernæst udlæg, helst i to såretninger. Eventuelt tromles imellem de to såninger
- Ø Vær opmærksom på at undgå spor i marken forårsaget af traktorer og gyllevogne
- Ø Undgå at så kløvergræs efter kløvergræs. Der er risiko for "kløvertræthed" Et kløverfrit år anbefales