

Ny græsmark i august




Er din græsmark i form til en sæson mere?

Efter den længste vinter med snedække i mange år blev mange græsmarker i foråret lagt om, eller der blev sået nyt frø oveni den eksisterende mark. Her i juli-august er det tid til igen at give græsmarkerne en kritisk gennemgang.

- Lykkedes isåningen?
- Er den mark, der i foråret så ud til at være OK, også i stand til at klare endnu en vinter – og yde det den skal næste år?
- Hvordan ser den samlede foderforsyning ud efter de første slæt?



HØJESTE UDBYTTET VED TIDLIG SÅNING



Udbytte (1. slæt) af sommerudlagt kløvergræs i renbestand og med dæksæd af hvede. 1. slæt høstet 29. maj. 5 forsøg (2 tidligt såede, 3 sent), udlæg 2005, høst 2006. Dansk Landbrugsrådgivning 2007.

Konklusioner om sommerudlæg

- Bedste metode for udlæg af kløvergræs er uden dæksæd i første halvdel af august.
- Der er ikke væsentligt merudbytte ved at anvende dæksæd, så 30-40 kg vinterhvede bør kun anvendes, når såtiden er efter midten af august.
- Udsædsmængde 30-32 kg pr. ha af frøblanding.
- Såning af udlæg skal ske i fugtig jord hurtigst muligt efter høst af foregående afgrøde for at undgå udtørring af jorden.
- Vær opmærksom på bladrandbiller i kløver.
- Græsset må ikke være mere end 6-7 cm før vinteren. Afpudsning kan være nødvendig.
- Alle frøblandinger, der hovedsagelig indeholder hurtigtvoksende rajgræsser og rajsvingel, kan sås om sommeren.



FORAGEMAX

by DLF-TRIFOLIUM

Nyt græs uden omlægning

Alternativet til en total omlægning af græsmarken kan være en eftersåning. Hvis marken er tynd efter sommerens benyttelse eller måske helt tilbage fra vinteren, er der grund til at løse problemet.

10% fald i udbyttet i græsmarken svarer til 800-1.000 kr. pr. ha. En tur med direkte såmaskine eller strigle med såkasse og frø koster oftest mindre. Eftersåning er derfor en overvejelse værd som en mere eller mindre rutinemæssig del af græsmarkens pleje. Med eftersåning kan marken holdes ung og tæt uden omlægning.

Sensommer efter 3. slæt eller umiddelbart efter afgræsning er et godt tidspunkt for eftersåning. Tidligt forår er også en mulighed, især hvis der er opstået vinterskader i marken. Der kan anvendes en direkte såmaskine eller blot en strigle med frøskasse. Tromling efter såning er normalt en god idé for at sikre frøet kontakt med fugtig jord. Hybrid- og almindelig rajgræs er meget velegnet til eftersåning.

iSeed hæver udbyttet

Nye resultater fra Holland viser, at såmetoden er af betydning, og at iSeed er en fordel, hvis græsset skal sikres en god og hurtig start.

RESULTAT AF EFTERSÅNING

Såning 17. marts	Antal nye skud/m ² 6. april	Antal nye skud/m ² 13. april
Ingen eftersåning	13	34
Græsmarks-strigle, normalt frø	37	53
Græsmarks-strigle, frø med iSeed	57	87
Direkte såning, skiveskær, normalt frø	85	112
Direkte såning, skiveskær, frø med iSeed	102	126

Forsøg med eftersåning, forår 2010. DLF-TRIFOLIUM, Holland

Se mere på www.dlf.dk under produkter.

VIDSTE DU AT...

...DLF's tetraploide rajgræs KENTAUR i løbet af to år producerer ca. 2.000 kg mere tørstof pr. ha sammenlignet med den diploide sort Aberdart?

Hos DLF-TRIFOLIUM mener vi, at græs er meget mere end sukker.

...DLF's rajsvingel PERSEUS har 5-6 dage senere skridning end Felopa – tidspunkt for høst af 1. slæt bliver derfor mere fleksibelt?

Hos DLF-TRIFOLIUM mener vi, at rajsvingel har en central plads i danske græsmarker.

...DLF's strandsvingel JORDANE i løbet af to år producerer ca. 3.000 foderenheder mere pr. ha end almindelig rajgræs?

Hos DLF-TRIFOLIUM mener vi, at nye tider kræver nye løsninger.

...ForageMax blandinger fra DLF-TRIFOLIUM forhandles over hele landet af DLG, Frøsalget Hornsyld Købmandsgaard, Brdr. Ewers, Møllerup Mølle, AFI Grovvarer, Nielsen & Smith, Stadil Købmandsgaard med flere.

Hos DLF-TRIFOLIUM mener vi, at alle kvægbrugere har krav på godt frø

