

Ved en tør sommer kan man eventuelt trække et slæt som planlægges til kvierne, hvorefter man laver en god kvalitet i de resterende slæt over sæsonen. Foto: FBG Medier – Morten Damsgaard.



Slætstrategien skal hænge sammen med fodringsstrategien

Inden længe starter årets kløvergræs-høst. Lav en slætstrategi før du går i gang med mål for fordøjelighed og proteinindhold i de enkelte slæt.

Din slætstrategi danner forudsætningen for din økonomi i fodringen og for resultaterne i stalden. Bliver græsset for tungtfordøjeligt, mister man mælkeproduktion og får en dyrere fodring. Bliver græsset for letfordøjeligt kan det i nogle foderationer være svært at styre køernes sundhed.

Overvejelserne bag slætstrategien bør starte hos køerne. I hvilken ration skal græsset fodres? Er det en ration med kun få kg TS i græs, der supplerer majs, eller er græsset det eneste grovfoder? Det gør kravene til slætstrategi forskellige.

En anden vigtig del af overvejelserne ligger desuden i din græsblending. Hvilke kløver- og græsarter eller sorter? Nogle græsarter har som udgangspunkt en lavere fordøjelighed, hvorfor tidspunktet for slæt

bliver afgørende for kvaliteten. I andre græsarter er det ikke så vigtigt, at man lige rammer den rigtige dag, da udgangspunktet er en højere fordøjelighed – eventuelt kombineret med en langsommere vækst.

Fordøjeligheden er en balancegang

I en græsrig foderration kunne målet for fordøjeligheden af organisk stof som gennemsnit af slættene være 78-80 procent til de malkende køer for at sikre en optimal mælkeproduktion og økonomi.

I 1. slæt er det lettest at sikre en super letfordøjelig kvalitet. Hvis 1. slæt skal fodres alene, er det dog ikke målet at få en alt for letfordøjelig kvalitet med risiko for et højt sukkerindhold, da det ofte kan være svært at styre inde i stalden.

Omvendt er faldende

mælkeproduktion og mere indkøbt tilskudsfoder en konsekvens af for lav fordøjelighed. I DLF har vi blandt andet fokus på udvikling af sorter med høj fordøjelighed af cellevæggene, da det er en meget vigtig parameter i forhold til økonomien i mælkeproduktionen. Disse sorter mærker vi med "DLF Fiber Energy".

Proteinindhold – mere selvforsyning

Mange efterspørger mere protein i kløvergræsset for at øge selvforsyning og sænke foderomkostningerne.

I forhold til slætstrategien er der en klar sammenhæng mellem en god, letfordøjelig kvalitet og et højt proteinindhold i kløvergræsset. Dette gælder i alle slættene. Man kan for eksempel kigge på tiden mellem 1. og 2. slæt – se Figur 1.

I denne periode falder proteinindholdet i græsset med

Af Tom Vestergaard, DLF Seeds & Science



omkring 4 g/døgn jf. Landsforsøgene frem mod 2. slæt.

Det vil sige, at råproteinindholdet i løbet af en uge falder fra eksempelvis 19 procent til godt 16 procent. I samme periode vil fordøjeligheden af organisk stof falde med omkring 4 procent - fra eksempelvis 79 til 75 procent (se Figur 2).

Herudover er det vigtigt at arbejde med kløverindholdet i græsmarken. En god kløverandel giver også højere proteinindhold.

Vigtige elementer i en god kløverandel er korrekt etablering og gødskning. Har man udfordringer med kløver i græsmarken, kan man også kigge på sammensætningen af græsblandingen. Vælg sorter af kløver med god konkurrenceevne over for de valgte græsarter.

Samensilering eller flere stakke åbne

Det er velkendt, at det typisk

er under foderskift, at der opstår problemer i mælkeproduktionen. Noget af dette skyldes den ret store forskel på grovfoderet, når man skifter ensilagesilo.

Næringsstofmæssigt og fysisk kan græsslættene være meget forskellige. 1 slæt har typisk et relativt lavt proteinindhold, en god fordøjelighed og nogle gange et højt indhold af sukker.

Kigger man på eksempelvis 4. slæt vil der afhængig af vejrforholdene ofte kunne opnås et højt proteinindhold og en fornuftig fordøjelighed. Ved at blande slættene i foderrationen kan man reducere antallet af foderskift samt øge synergien mellem slættene.

Det er en klar fordel, hvis der på ejendommen er mulighed for at lave forskellige ensilagestakke til kvier og køer. Så kan der

være optimal fokus på at lave letfordøjeligt og proteinrigt græs til de malkende og mere fyldende og mere passende proteinindhold til kvierne – selvfølgelig afhængig af de forskellige foderrationer.

Lav en slætstrategi for årets høst

Inden længe starter årets kløvergræshøst. Lav en slætstrategi før du går i gang. Hvad er målet for fordøjelighed og proteinindhold i de enkelte slæt.


- Kig på sidste års grovfoderanalyser.
- Hvordan kører fodringen?
- Skal der mere græs i foderrationen?

- Skal der fokus på mere protein i kløvergræsset?
- Skal der være mulighed for at fodre flere græsslæt på samme tid?
- Er udbyttet i kløvergræs ok – eller skal der laves en plan for dette?

En 5-slæts-strategi vil de fleste steder kunne opfylde kravet til grovfoderkvalitet. Specielt hvis man har mulighed for at dele ensilagen op i henholdsvis kviegræs og græs til de malkende køer.

Ved en tør sommer kan man eventuelt trække et slæt som planlægges til kvierne, hvorefter man laver en god kvalitet i de resterende slæt over sæsonen ■

Figur 1



Figur 2

