


Hvilken blanding skal jeg vælge?



OVERSICHT OVER VILDTBLANDINGER

VILDT	UDSÆDSMÆNGDE, KG/1000 M ²	PAKNINGSSTØRRELSE, KG
FUGLEVILDT		
Kyllingemix, forårssåning	4,0	10
Kyllingemix, efterårssåning	3,6	10
Traditional Game Cover Mixture	2,5	10
Decoy Game Mixture	2,0	8
Late Cover Mixture	1,25	5
Boost Mixture	0,6	5
Millgame Millet Mix	1,25	5
MARKVILDT		
Insektvold/redeskjul	1,6	2
Markvildt, dækning og føde	3,6	10
Pollen og nektar blanding	1,5	2
HJORTEVILDT		
Sommermix til hjortevildt	8,5	10
Helårsmix til hjortevildt	3,5	2 og 10
Skoveng og vildtager	3,5	10

Vildtager – et positivt bidrag til naturen

Etablering af vildtagre kan være med til at forbedre vildtets muligheder væsentligt uden nødvendigvis at ødelægge vilkårene for det eksisterende land- og skovbrug. Samtidig kan en vildtager med sin blomstring og sit insektliv også bidrage til flere og rigere oplevelser for de mennesker, der færdes derude.

I denne lille folder gives der oplysninger om blandinger og etablering af vildtagre, der tjener forskellige formål. God fornøjelse og god arbejdslyst!

Forhandler:



Etablering af vildtagre

Etablering af vildtagre



Forberedelse - forår

Ved traditionel dyrkning gøres arealet klar med en grundig bearbejdning af jorden ved pløjning og jordpakning, eventuelt fræsning. Herefter ligger jorden urørt i nogle uger, så ukrudt kan få tid til at spire. Måske skal den eksisterende mark først behandles med et ukrudtsmiddel (f.eks. Roundup), der fjerner alle planter, hvis der er meget rodukudt (kvik, tidsler, skræpper mv.) på arealet.

Ved pløjefri dyrkning vil proceduren være først at sprøjte mod rodukudt (Roundup), lade jorden hvile 10 dage, hvorefter der harves og sås umiddelbart efter.



Harvning

Lige før såning harves jorden 1-2 gange i 6-8 cm dybde, så jorden er løs og jævn. Der skal ikke harves mere end netop nødvendigt for at lave et jævnt såbed. Undgå så vidt muligt at udtørre jorden – fugtigheden bør bevares så højt oppe i jorden som muligt.



Tromling

På sandjord kan der evt. tromles umiddelbart efter med cementtromle. På lerjord tromles evt. med ring- eller knasttromle. Formålet er at pakke det øverste jordlag, så frøet ikke kommer for langt ned i jorden, og at der sikres god kontakt mellem frø og den fugtige jord.



Gødning

Hvis vildtageren må gødes (ikke tilladt på f.eks. udyrket jord), bør jorden grundgødskes før såning, så de nye planter er sikret næring i den første tid. Det er vigtigt, at gødningen fordeles helt jævnt over arealet. Det anbefales at anvende NPK-gødning. Følg altid emballagens anvisninger, når du doserer gødning.



Såning

Til såning er det en fordel at vælge en periode, hvor jorden indeholder nogen fugtighed. Samtidig er det en fordel, at jorden er lun, mindst 10° C, for det fremmer både spiring og rodvækst. Den bedste såtid er derfor hele maj måned. Såning skal ske straks efter jordbehandlingen. Frøene i sækken har forskellig størrelse, så for at få en jævn fordeling af store og små frø, skal frøene blandes grundigt, før de sås. Rækkeafstanden skal være lille, så frøet fordeles så godt som muligt over hele arealet. Såning bør ikke ske dybere end ca. 1-2 cm. Følg den anbefalede udsædsmængde for den enkelte art/blanding.

Fire gode råd til etablering af vildtagre:

1. Pløj om efteråret
2. Harv jorden når den er tør om foråret – vent derefter tre uger
3. Bekæmp ukrudt med Roundup og vent yderligere to uger til ukrudtet dør
4. Harv jorden og så frøet i 1-2 cm dybde, når jordtemperaturen er 10° C. Tildel NPK-gødning og troml eventuelt til slut



Blandinger til vildt

FUGLEVILDT:

Kyllingemix forår og efterår

Giver hønsefugle med kyllinger de bedst mulige forhold til fødesøgning.

Traditional Game Cover Mixture

Dækning hele sæsonen, rigeligt foder til alt fuglevildt.

Decoy Game Mixture

Optimal dækning hele sæsonen, nem at etablere.

Late Cover Mixture

Hurtig udvikling, fantastisk vinterdækning. Også til eftersåning.

Boost Mixture

Såning forår eller sensommer (også eftersåning). Bliver op til 2 m høj. Særlig vinterfast.

Millgame Millet Mix

Rød og hvid hirse. Dekorativ blanding med meget foder til fuglevildt.

MARKVILDT:

Insektvold/redeskjul – græsblanding til bræmmer

Overvintringssted for insekter, forbedrer fødegrundlaget for hønsefugles kyllinger.

Markvildt, dækning og føde

Yder gennem flere år den nødvendige vinterdækning for harer, fugle mv.

Pollen og nektar blanding

Leverer pollen og nektar til glæde for bier, fluer, sommerfugle mv. og dermed også for fuglevildtets unger.

HJORTEVILDT:

Sommermix til hjortevildt

Kløvergræs rig på næring og mineraler blandet med korn og boghvede.

Helårsmix til hjortevildt

Tilbyder fødemuligheder allerede kort efter etablering og frem til og med vinterperioden.

Skoveng og vildtager

Giver føde til vildtet og ny næring i den ofte næringsfattige skovjord.

Du kan finde yderligere information om blandinger til vildt på www.dlf.dk under Produkter/Vildtafgrøder.