

# Boost Mixture

## Dyrkningsvejledning



**Boost Mixture stammer fra DLF's engelske produktprogram til vildtagre, "Your Countryside". Blandingen er sammensat af arterne kål (*Brassica carinata*), hybridkål, olieræddike og brun sennep.**



### ANVENDELSE

Boost Mixture er en hurtigt etablerende og voksende blanding, der tåler hård frost. Kan sås i sensommeren eller det tidlige efterår. Giver et fantastisk dække hen over vinteren med en højde på op til 2 m. Den er sublim til eftersåning, hvis en tidligere sået blanding er mislykket eller hvis man bare ønsker at så en vildtager sent.

Blandingen trives på næsten alle jordtyper. Kan indgå i biotopplan og desuden udgøre en lovpligtig efterafgrøde..

### DE ENKELTE ARTER I BLANDINGEN

**Kål – *Brassica carinata***, sorten Texsel Greens, er en hurtigt voksende korsblomstret plante med en høj stængel. Blomsterne er lysegule og de olieholdige frø indeholder bla. erucasyre.

**Hybrid kål** giver god dækning til hønsefugle og producerer god og rigelig vinterføde til hjortevildt og hare.

**Olieræddike** giver god dækning for fugle samt føde for rådyr og hare. Olieræddike tåler nogen frost, men vil ikke overleve de fleste vintre.

**Brun sennep** er hurtigt til at etablere sig og énårig, det vil sige at den blomstrer og sætter frø det første år – til glæde for insekter og fugle.

### SÅBED

Det er af afgørende betydning for opnåelse af et godt resultat med frøblandingens såbeds-tilberedningen udføres med stor omhu. I almindelighed må det anbefales at foretage en god pløjning med efterfølgende jordpakning. Selve opharvningen kan herefter indskrænkes til det mindst mulige for at undgå tab af fugtighed i såbedet.

Hvis arealet er befængt med rodukrudd som f.eks. kvik og tidsler kan det være hensigtsmæssigt at foretage en sprøjtning med Roundup efterfulgt af jordbearbejdning tidligt forår. Er der meget ukrudt, kan en Roundup sprøjtning lige inden såning blive aktuell.

### UDSÆD

Den vejledende udsædsmængde for Boost Mixture er 6 kg. pr. ha. Det færdige resultat vil altid blive bedre ved for lav udsædsmængde end ved for høj. Ved stor plantetæthed får den enkelte plante ikke lov til at udvikle sig optimalt pga. den konkurrence om vand, plads og næring, der er fra naboplanterne. Får planterne for meget plads, kan ukrudtstrykket udkonkurrere dem. Vi ønsker en åben afgrøde af hensyn til insekter og fødesøgningsmuligheder for fugle og harer.

### SÅNING OG SÅTIDSPUNKT

Der skal sås når jordtemperaturen er så høj, at frøene spirer optimalt. De fleste frø, som anvendes til vildtagre mv., spirer bedst ved jordtemperaturer på 8-10 °C og derover. Det tjener derfor ikke noget formål at så frø i det tidlige forår, hvorefter det først spirer efter 3-4 uger, når jordtemperaturen bliver høj. Inden da vil ukrudtsarter have overtaget såbedet, og vildtafgrøden vil ikke kunne klare konkurrencen.

Man skal helst så 4-5 uger senere end markafgrøder almindeligvis sås. Det vil normalt være fra sidste halvdel af maj måned og frem til juli. Derved udsættes modningstidspunktet også, og vildtagrene kan supplere optimalt i det øjeblik de omliggende marker bliver høstet, og føden/dækningen dermed forsvinder.

Ved større vildtagre kan det klart anbefales at anvende såmaskine, som kan placere frøene i 1-2 cm's dybde. Efter såningen tromles for at sikre optimal fremspiring.

Er det meget små vildtagre der skal etableres, kan udsæden spredes med hånden. Det vil da være en fordel at opblande udsæden med noget fasanfoder, tørret sand, bøgesmuld eller lignende for at lette udsåningen. Efterfølgende harves frøene ned i et par cm's dybde og der sluttes med en tromling.

## GØDSKNING

For at få det optimale udbytte skal gødningsforholdene være i orden. Rå, næringsfattig jord, som ikke tidligere har været dyrket, skal først i gang. Det kan gøres ved at tilføje 7-8 tons kalk pr. ha., samt grundgødning med fosfor og kalium afhængig af resultaterne af jordbundsanalyse. Når jorden først har fået grundgødning, kan man nøjes med hvert år at give afgrøderne vedligeholdelsesgødning i form af handelsgødning.

Vær opmærksom på restriktioner på anvendelse af gødning på f.eks. udyrkede arealer og i områder omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3.

Vær også opmærksom på, at der på landbrugsjord er normer for anvendelsen af kvælstof.

## UKRUDT

Brug af herbicider, insekticider, fungicider mv. bør undgås af hensyn til produktionen af larver og insekter, da disse er vigtige for hønsefuglenes kyllinger. Der er dog undtagelser. Hvis vildtageren er særligt befængt med f.eks. kvik eller tidsler vil det være vanskeligt at etablere vildtafgrøder. Det kan derfor være nødvendigt at anvende midlet Roundup inden etablering.