

SOMMERFUGLEBL ANDING

- Vilde blomster med sommerfugletække
- Bedre biodiversitet -21 forskellige arter
- Langvarig blomstring



Flerårig frøblanding med 21 vilde blomsterarter

Velegnet til at tiltrække sommerfugle

Såtidspunkt:

Midt april-primio juni og august-september

Udsædsmængde:

2 kg pr. 1000 m²

For at opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med [Rehofix majscolbegrænulat](#).

Pleje:

Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring - dog senest d. 1. marts. Afklippet skal fjernes. Der må ikke gødes.

Ved problemer med brændenælder, gråbynke, agertidsel m.fl., er det nødvendigt at håndluge, før de kaster frø. Alternativt en sommerslåning. Afklippet skal fjernes.

Plantehøjde:

15-150 cm

Blomstring:

April-september

Sammensætning

Flerårig: Alm. Røllike, *Achillea millefolium*; Hjortetrøst, *Eupatorium cannabinum*; Hulkravet kodriver, *Primula veris*; Knoldet mjødurt, *Filipendula vulgaris*; Purpursolhat, *Echinacea purpurea*; Moskuskatost, *Malva moschata*; Kæmpe margurit, *Chrysanthemum maximum*;

Enårig: Alm. hjulkrone, *Borago officinalis*; Atlaskblomst, *Godetia grandiflora*; Brudeslør, *Gypsophila elegans*; Evighedsblomst, *Helichrysum*; Judaspønge, *Lunaria annua*; Kornblomst, *Centaurea cyanus*; Morgenfrue, *Calendula officinalis*;

Toårig: Velduftende aftenstjerne, *Hesperis matronalis*; Alm. Slangehoved, *Echium vulgare*; Humle-sneglebælg, *Medicago lupulina*; Gyldenlak, *Cherianthus cheirii*;

Pakning: 1 kg

Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand.

Vi anbefaler *ikke* at blande blomsterfrø med græsfrø. Gør man det alligevel, er det vigtigt kun at bruge tueddannende græsser og at andelen af græsfrø aldrig overstiger 40%. [Pryd- og natur-græsblanding](#) er mest velegnet til det formål. Sås der blomsterfrø i et tyndt bevokset græsareal, anbefaler vi også at så [Liden skjaller](#) for at holde græsset i ave.

Særligt for produktet

- 21 forskellige vilde blomster for sommerfugle